

Epingle®

PYRIPROXIFEN 10% EC

USO: Insecticida

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

Preparación: Llenar el tanque de la maquina pulverizadora hasta la mitad con agua, agregar la cantidad necesaria del producto (previamente agitando el envase) completar el faltante del tanque con agua, mantener en funcionamiento el sistema de agitación.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:

LIMÓN: Aplicar con equipos de alto volumen y alta presión, con manguera y turbina hasta punto de goteo, procurando un volumen de entre 30 y 40 litros por planta.

TOMATE: Aplicar con equipos terrestres, como mochilas a motor, procurando una cobertura uniforme del cultivo, prestando especial atención de alcanzar el envés de las hojas. Cobertura: 50 a 70 gotas cm², tamaño de gota: 200-400 micrones. Uniformidad: 10-20% de coeficiente de variación.

RECOMENDACIONES DE USO:

No presenta condiciones especiales de uso más que las indicadas en el cuadro de recomendaciones. Evitar aplicar frente a condiciones ambientales desfavorables: temperatura mayor de 30°C; Humedad relativa menor de 40 %; viento mayor a 15 Kph. Agregar coadyuvantes según recomendaciones locales.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Limón	Cochinilla roja australiana (Aonidiella aurantii)	30 - 50 cm ³ /hl	25	Aplicar el producto una vez por temporada, a la caída de los pétalos o a l momento del cuaje del fruto.
Tomate	Mosca blanca (Bemisia tabaci)	50 - 75* cm ³ /hl	7	Aplicar el producto al observarse la eclosión de huevos (*) y/o la aparición de las primeras ninfas. Repetir a intervalos de 7 a 14 días para el control de eclosiones posteriores. Como el producto no posee acción directa sobre formas adultas o aladas, se recomienda la mezcla con un insecticida adulticida. (*) La dosis mayor presenta acción ovidicida, principal mente en huevos de 1 a 3 días de edad.
	Mosca blanca de los invernáculos (Trialeurodes vaporariorum)			

RESTRICCIONES DE USO:

Tiempo de reingreso al área tratada 24 Hs.

Período de carencia: Tomate: 7 días. Limón: 25 días.

En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

SUMMIT AGRO ARGENTINA S.A.

Carlos Pellegrini 719, Piso 8 (C1009ABO) Bs. As. Argentina
Tel: 0810 - 333 - Summit (786648)

UNA EMPRESA DEL GRUPO SUMITOMO CORP.

COMPATIBILIDAD:

EPINGLE es compatible con la mayoría de los productos comúnmente usados en los cultivos de limón y tomate. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad química y biológica de cualquier mezcla que se intente hacer, consultar con un Ingeniero Agrónomo.

FITOTOXICIDAD:

No se observaron casos de fitotoxicidad a las dosis recomendadas. No se producen efectos sobre los cultivos subsiguientes.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.

SUMMIT AGRO ARGENTINA S.A.

Carlos Pellegrini 719, Piso 8 (C1009ABO) Bs. As. Argentina
Tel: 0810 - 333 - Summit (786648)

UNA EMPRESA DEL GRUPO SUMITOMO CORP.