

ESTIMULANTE BIOLÓGICO MICROBIANO

CENTEON MAX[®]

POLVO MOJABLE

COMPOSICIÓN

Bacillus subtilis cepa N5 a la fecha de elaboración 3×10^7 UFC/g y 1×10^6 UFC/g al vencimiento.

Trichoderma virens cepa Liuto a la fecha de elaboración 7×10^7 UFC/g y 1×10^6 UFC/g al vencimiento.

Inscrito en el SENASA con el N° 60013-BIO

Origen: Chile

Contenido neto:

Fecha de elaboración:

Fecha de vencimiento:

N° de lote:

Establecimiento elaborador N° PB-0089

Fabricado por:



Bio Insumos Nativa SpA

Parcela Antihue Lote 4B-2, Maule, Chile.

Fono: +56712970696

Casilla 6 Maule /

e-mail: bionativa@bionativa.cl www.bionativa.cl

Registrado por:



TerraBio S.A.S.

Estrada 534, Tres Arroyos, Buenos Aires –
ARGENTINA

+54 9 2983 535777 / +54 9 2983 610838

@terrabiosas

Email: terrabiosas@gmail.com

Distribuido por:



SUMMIT-AGRO ARGENTINA S.A.

Carlos Pellegrini 719 piso 8º
C1009ABO Buenos Aires-Argentina

Tel: (011)3750-6750-

Fax: (011)3750-6750 (Int. 115)

www.summit-agro.com/ar

e-mail: org@summit-agro.com

1kg

Generalidades: CENTEON MAX® es un consorcio microbiano bioestimulante, elaborado como polvo mojable a base de cepas de *Trichoderma virens* y *Bacillus subtilis*, que promueve la estimulación natural de las plantas, activando el desarrollo de raíces. Su aplicación colabora en superar deficiencias en el crecimiento de las plantas, bajo condiciones de estrés abiótico.

Preparación de la mezcla: Mezclar el CENTEON MAX® con agua, sin contenidos de cloro, hasta lograr una suspensión homogénea, manteniendo la agitación. Aplicar por el sistema de riego o pulverizaciones foliares, utilizando los equipos habituales para el cultivo.

Para el tratamiento de semillas, aplicar en máquinas para el curado de semillas, pudiéndose utilizar, de ser necesario, hasta no más de 300 a 400 mL de agua para una mejor uniformidad de aplicación.

La preparación debe aplicarse máximo 4 horas después de preparada y mantenida en agitación.

CULTIVO	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
Tomate	1 a 2 kg/ha	Realizar tres aplicaciones: - En plantación. - Primer ramo floral. - Tercer a cuarto ramo floral.
Pimiento, berenjena, papa y tabaco	1 a 2 kg/ha	Realizar tres aplicaciones: - En plantación - Repetir a los 30 días y 60 días.
Trigo, Cebada Avena, centeno	1 a 2 kg/ha	Aplicación foliar en macollaje
	150 g/100 kg de semilla	Tratamiento de semillas
Maíz	2 kg/ha	Aplicación en V2 a V4
	300 g/100 kg de semilla	Tratamiento de semillas
Soja	1 a 2 kg/ha	Aplicación en VC – V 1
	200 a 300 g/60 kg de semilla	Tratamiento de semillas

Compatibilidad: Incompatibilidad para aplicaciones conjuntas con compuestos cúpricos, fungicidas y antibióticos. No mezclar CENTEON MAX® con plaguicidas y agroquímicos sin realizar antes una prueba de compatibilidad o por instrucción del fabricante. Consultar lista de compatibilidad con el fabricante.

Almacenaje: Debe ser almacenado en ambiente fresco y seco por un máximo 12 meses. Mantener en su envase original, con su respectiva etiqueta.

Fitotoxicidad: No presenta fitotoxicidad en los cultivos.

Precauciones y Advertencias: Para su seguridad en la preparación y durante la aplicación evite el contacto con la piel, ojos y vestimenta, así como su ingestión. Utilizar ropa protectora adecuada para la labor.

Para su seguridad después de la aplicación, lávese después del trabajo y antes de comer. Cámbiese y lave la ropa de trabajo antes de volver a utilizarla. Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.