



# Proquelate<sup>®</sup> Mg

**Aportador de Magnesio de Alta Asimilación**

*Fertilizante*



<b>Análisis Garantizado</b>	<b>% p/v</b>
Magnesio (MgO) .....	5.8
Carbono Orgánico Oxidable Total .....	2.25

Solubilidad en agua: 100%, a 20 °C  
 pH: 3.0  
 Densidad: 1.2 g/mL, a 20 °C

**Fecha de Caducidad:** 3 años a partir de su formulación.

Contenido:

No. Lote

Fecha Formulación



*Distribuido por:*



SUMMIT - AGRO CHILE SpA  
 Orinoco 90, Oficina 2002,  
 Las Condes - Santiago  
 Tel. (56 2) 24306300  
 www.summit-agro.cl

*Fabricado por:*



Innovak Global, S.A. de C.V.  
 Blvd. Vicente Lombardo Toledano #6615  
 Col. Concordia Chihuahua, Chih. México C.P. 31375  
 Tel. (614) 436-0138 Fax (614) 415-4770  
 www.innovakglobal.com

## “ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

Lea cuidadosamente las instrucciones de la etiqueta. Use el equipo de protección adecuado y completo: overol o camisa de manga larga y pantalón, mascarilla para polvos, lentes industriales, guantes y botas de hule. Después de una jornada de trabajo, báñese y use ropa limpia.

### “PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.

“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA”.

“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”.

“LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.

“NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL”.

“EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO, LLEVE A LA PERSONA CON EL MÉDICO”.

### “PRIMEROS AUXILIOS”

**En caso de ingestión accidental:** Enjuague la boca con abundante agua y suministre un alcali débil (bicarbonato de sodio).

**En caso de contacto cutáneo:** Quítese toda la ropa contaminada. Ponga la piel en contacto con agua corriente (ducha o manguera) en abundancia. Lave el área afectada con agua corriente y jabón, seque perfectamente la piel y póngase ropa limpia.

**En caso de contacto ocular con el producto:** Mantenga los párpados abiertos e inmediatamente lave el ojo con una corriente moderada de agua. Continúe lavando cuando menos por 15 minutos, si la irritación persiste consulte a su oftalmólogo.

### “MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE”

“RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO”.

“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD”.

“RESPETE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS”.

“NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACÍOS DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”.

“NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO O AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”.

“NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”.

“NO VIERTA EL AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”.

“RESPETE LAS DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO”.

**GARANTÍA:** Innovak Global, S.A. de C.V. garantiza la composición y contenido publicada en esta etiqueta siempre y cuando el producto haya sido adquirido en un establecimiento autorizado y el envase de este producto cuente con su sello de seguridad, haya sido almacenado apropiadamente y se utilice antes de su fecha de expiración. Innovak Global, S.A. de C.V. garantiza la efectividad del producto siempre y cuando se sigan al pie de la letra las indicaciones de uso contenidas en esta etiqueta. Dado que el manejo, transporte, dosificación y aplicación de los productos están fuera de su control, Innovak Global, S.A. de C.V. no se hace responsable por efectos inesperados obtenidos como consecuencia del mal uso, dosificación equivocada, manejo errado o uso de productos expirados o mal conservados.

Metales Pesados	Menor a: (ppm)
Arsénico (As)	2.0
Cadmio (Cd)	2.5
Mercurio (Hg)	4.0
Plomo (Pb)	3.3

## INSTRUCCIONES DE USO: SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

**Proquelate® Mg** es una formulación a base de extractos concentrados de cascarillas agrícolas **ECCA Carboxy®** y Magnesio, que previene y corrige desórdenes nutricionales ocasionados por la deficiencia de este elemento. Por su composición se logra un eficaz ingreso a la planta.

**Proquelate® Mg** ha sido diseñado para aplicaciones foliares preventivas y correctivas de la nutrición de Magnesio y desórdenes del tipo fisiológico como fiebre de primavera y/o toxicidad de Nitrógeno-amoniaco (acumulación de putrescina), palo negro y vaha acuosa, entre otros.

El Magnesio, en la forma de un quelato natural es reconocido y absorbido rápidamente por la planta, promoviendo una mejor función de la clorofila, maduración del cloroplasto y activa la fijación del CO<sub>2</sub>, mejorando el proceso fotosintético.

En aplicaciones post cuaja y pinta, al ser aplicado en mezcla con **Packhard®**, ayuda a mitigar el palo negro.

Por la baja concentración de Magnesio, es muy seguro y eficaz para ser aplicado en cualquier momento del ciclo de desarrollo de la planta. No produce ni mancha ni russet.

### USO:

**Proquelate® Mg** debe ser aplicado por aspersión foliar mezclado con suficiente agua para lograr una adecuada cobertura del cultivo.

Para preparar la solución de aspersión con agua agite el envase, desenrosque la tapa y retire el sello de seguridad; mida la cantidad a aplicar en probeta o recipiente graduado y vierta en cubeta para premezcla, diluya completamente y finalmente vierta en el tanque de la aspersora conteniendo la mitad del volumen de agua, agite y complete el total del volumen de aspersión.

### DOSIS:

Cultivo	Dosis (L/ha)	N° de aplicaciones	Concentración (cc/100 L de agua)	Momento de aplicación
Vides de mesa y Vides para vino.	2-3	2-3	200	* 30 días después de brotación. * 45 días después de brotación. * Pre pinta a pinta.
Manzanos, Perales.	1-3	2-3	100	* Puntas verdes. * 15 días después. * Opcional en fruta cuajada.
Carozos	2-3	2-3	200	* Inicio de brotación en primavera. * En pleno desarrollo vegetativo. * 7 días después de cuaja.
Frutales de nuez	2-3	2-3	200	* Brotes de 3 a 5 cm. * Caída de armentos. * Opcional 2 semanas después.
Citricos	1,5-2	2-3	100	* Inicio de crecimiento vegetativo. * En pleno desarrollo vegetativo. * Opcional en fruta cuajada.
Paltos	1,5-3	2-3	100	* En pleno desarrollo vegetativo. * Fruto recién cuajado. * Opcional pleno desarrollo de fruto.
kiwi	1,5-2	2-3	100	* 30 días después de brotación. * Desarrollo de frutos. * 60 días antes de cosecha.
Olivos	1,5-3	2-3	200	* Inicio de brotación. * En pleno desarrollo vegetativo. * Fruta cuajada.
Berries	1-2	2-3	100	* Inicio de crecimiento vegetativo. * En pleno desarrollo vegetativo. * Fruta cuajada.
Pimientos, Aji, Tomates, ajos, Cucurbitáceas, Cebollas y Papas.	1-2	1-2	150	* En pleno desarrollo vegetativo. * Desarrollo de frutos (tomates, aji, pimientos y cucurbitáceas). * Desarrollo de bulbos (cebollas y ajos). * Desarrollo de tubérculos (papas).

### COMPATIBILIDAD :

No mezclar con productos que contengan Calcio o fosfatos. Al realizar una mezcla no conocida, se recomienda efectuar una confirmación previa de compatibilidad y miscibilidad o consultar a nuestro departamento Técnico.

ATENCIÓN A CLIENTES



+52 614 436 00 66  
+56 2 2430 6300

**Proquelate® Mg**