

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Nematicida biológico compuesto por cepas nativas de los biocontroladores *Bacillus thuringiensis* y *Bacillus cereus*.

Para su seguridad en la preparación: Evite el contacto con la piel, ojos y vestimenta, así como su ingestión. Use guantes impermeables, botas de goma, overol impermeable, mascarilla para polvos y protector facial; aleje animales domésticos y personas extrañas.

Para su seguridad durante la aplicación: Evite el contacto con la piel, ojos y vestimenta, así como su ingestión. Use guantes impermeables, botas de goma, overol impermeable y protector facial; aleje animales domésticos y personas extrañas. No trabaje en la niebla generada al pulverizar el producto, no aplique con viento.

Para su seguridad después de la aplicación: Lávese después del trabajo y antes de comer. Cámbiese y lave la ropa de trabajo antes de volver a usarla.

Síntomas de Intoxicación: En caso de ingestión, posible diarrea; en caso de contacto con piel u ojos, posible irritación.

PRIMEROS AUXILIOS

Primeros Auxilios: Para todos los siguientes casos, trasladar al afectado inmediatamente a un servicio de urgencia. Llevar la etiqueta o el envase.

EN CASO DE INGESTIÓN: NO INDUCIR VÓMITO. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente. Lavar la boca con agua. Consulte a un médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Sacar la ropa y zapatos contaminados. Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón. Si la irritación continua, consulte a un médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar los ojos con abundante agua limpia por 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Si el afectado utiliza lentes de contacto, retirarlos 5 minutos después de haber empezado el enjuague. Si la irritación continua, consulte a un médico.

EN CASO DE INHALACIÓN: Trasladar al afectado al aire fresco. Si no respira, proporcionar respiración artificial. Consulte a un médico.

ANTÍDOTO: No posee antídoto específico.

TRATAMIENTO MÉDICO:

TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA: CAB de reanimación. Evaluar realizar lavado gástrico, seguido de administración de carbón activado. El tratamiento posterior es sintomático y de soporte.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.

LOS ENVASES: INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.

NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO.

No es tóxico a organismos acuáticos, aves, animales ni abejas.

Almacenaje: Bafex-N® debe ser almacenado en su envase original sellado, en un ambiente fresco y seco, bien ventilado. Tiempo máximo de almacenaje 24 meses.

Teléfonos de Emergencia CITUC EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS FONOS:

+56-2-26353800

CITUC EMERGENCIAS QUÍMICAS FONOS: +56-2-22473600 ATENCIÓN LAS 24 HORAS

Teléfonos Bio Insumos Nativa SpA. +56-71- 2970698/+56-9-95373310

BAFEX-N®

**NEMATICIDA BIOLÓGICO
POLVO MOJABLE (WP)**

BAFEX-N® es un nematicida biológico compuesto por cepas nativas de los biocontroladores *Bacillus spp.* Con acción sobre nematodos fitoparásitos según cuadro de instrucciones de uso.

COMPOSICIÓN	(% p/p)
<i>Bacillus thuringiensis</i> cepa Anemophila*	0,8 % p/p (8 g/kg)
<i>Bacillus cereus</i> cepa Bromelia**	0,8 % p/p (8 g/kg)
<i>Bacillus cereus</i> cepa Peumo***	0,8 % p/p (8 g/kg)
Cofomulantes c.s.p.	10,0 % p/p (100 g)

*Contiene una concentración de cepa $3,3 \times 10^7$ ufc/g
**Contiene una concentración de cepa $3,3 \times 10^7$ ufc/g
***Contiene una concentración de cepa $3,3 \times 10^7$ ufc/g

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

Fabricado por **Bio Insumos Nativa SpA.**
Parcela Antihue Lote 1 B7, Maule, Chile
Fono: +56 -71-2970698
ventas@bionativa.cl | www.bionativa.cl



Distribuido por
Summit Agro Chile SpA
Cinco Sur, Piso 20, Oficina 2001
Las Condes, Santiago, Chile



Autonomación Servicio Agrícola y Ganadero **N° 1824**

CANTIDAD LOTE VENCIMIENTO

® Marca registrada de Bio Insumos Nativa SpA.

NO INFLAMABLE • NO CORROSIVO • NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO

Generalidades: Las cepas de *Bacillus spp.*, presentan una acción contra nemátodos fitopatógenos como: *Meloidogyne* en Tomate; *Meloidogyne*, *Xiphinema* y *Criconemella* en Vid, *Tylenchus semipenetrans* en Cítricos (limones, naranjo y mandarino); *Meloidogyne arenaria* en Cucurbitáceas (Melón); *Meloidogyne incognita* en Lechuga y *Meloidogyne incognita* en Pepino, tal como se observa en el cuadro "Instrucciones de uso". Además, posee amplia aplicabilidad sobre plantas, como bioestimulante de raíces, mejorando el desarrollo vegetativo y el rendimiento.

La formulación de **BAFEX-N®** está compuesta por endosporas, las que son reconocidas como las estructuras de sobrevivencia más resistentes de la naturaleza, pudiendo soportar altas temperaturas y falta absoluta de humedad.

Instrucciones de Uso:

CULTIVO	ENFERMEDAD/ PATOGENO	DOSIS (g/hl ó 100 l)	ÉPOCAS DE APLICACIÓN
Tomate	<i>Meloidogyne incognita</i> .	8 kg/ha	Aplicar en presencia de poblaciones de <i>Meloidogyne</i> , aplicado en momento de plantación, 1º y 3º racimo. Aplicación mediante sistema de riego, con mojamientos de 5.000 l/ha.
Vid	<i>Meloidogyne sp.</i> <i>Xiphinema sp.</i> <i>Criconemella sp.</i>	3 kg/ha 5 kg/ha	Aplicación en presencia de poblaciones baja y medias de <i>Meloidogyne</i> , la dosis de 3 kg/ha. En presencia de poblaciones altas de <i>Xiphinema</i> y <i>Meloidogyne</i> aplicar la dosificación mayor de 5 kg/ha, aplicado al sector de raíces, ya sea por sistema de riego o cualquier método que asegure el mojado del bulbo de raíces.
Cítricos (limones, naranjo y Mandarino)	<i>Tylenchus semipenetrans</i> .	5 kg/ha	Aplicación en presencia de poblaciones de <i>Tylenchus semipenetrans</i> , aplicando al sector de raíces, ya sea por sistema de riego o cualquier método que asegure el mojado del bulbo de raíces.
Cucurbitáceas (Melón)	<i>Meloidogyne arenaria</i> .	5 kg/ha	Aplicación en presencia de poblaciones de <i>Meloidogyne arenaria</i> , aplicando al sector de raíces, ya sea por sistema de riego o cualquier método que asegure el mojado del bulbo de raíces.
Hortalizas de Hoja (Lechuga)	<i>Meloidogyne incognita</i>	3 kg/ha 5 kg/ha	Aplicación en presencia de poblaciones bajas (menores a 50 J2/250 cm³ de suelo), la dosis de 3 kg/ha. En presencia de poblaciones superiores, aplicar la dosis de 5 kg/ha, aplicando al sector de raíces, ya sea por sistema de riego o cualquier método que asegure el mojado del bulbo de raíces.
Pepino	<i>Meloidogyne incognita</i>	3 kg/ha 5 kg/ha	Aplicación en presencia de poblaciones bajas (menores a 50 J2/250 cm³ de suelo), la dosis de 3 kg/ha. En presencia de poblaciones superiores, aplicar la dosis de 5 kg/ha, aplicando al sector de raíces, ya sea por sistema de riego o cualquier método que asegure el mojado del bulbo de raíces.

No existen limitaciones al número de aplicaciones por temporada.

Preparación de la mezcla: Diluir en un recipiente con agua la cantidad necesaria de **Bafex-N®**, agitando fuertemente, luego dejar decantar por un minuto, antes de colocar en equipo de aplicación o riego. La preparación debe aplicarse máximo 4 horas después de preparada, y mantenida en agitación durante la aplicación.

Incompatibilidad: Incompatibilidad para aplicaciones conjuntas con desinfectantes industriales o de uso doméstico, compuestos cúpricos, antibióticos y cualquier bactericida para bacterias gram positivas. No mezclar **Bafex-N®** con otros plaguicidas sin realizar antes una prueba de compatibilidad. Consultar lista de compatibilidad con el fabricante.

Fitotoxicidad: No presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados.

Período de Carencia: No tiene.

Tiempo de reingreso al área tratada: No hay restricciones una vez aplicado el producto.

CUIDADO

