

PRECAUCIONES GENERALES Y ADVERTENCIAS

1. Al manipular el producto debe utilizar guantes, lentes y ropa adecuada. Evitar contacto con la piel y ojos, si fuese así, lavar con abundante agua. Si es ingerido o inhalado acudir inmediatamente al médico.
2. El producto debe almacenarse en su envase original, con su respectiva etiqueta, en un lugar fresco, seco, cerrado y de acceso restringido.
3. No coma, no beba ni fume al manipular el producto.
4. En condiciones climáticas extremas, abstenerse del uso de este producto. (Lluvia, viento etc)
5. Después de manipular el producto lavarse manos, cara o cualquier zona expuesta.
6. No almacenar ni transportar junto a alimentos de consumo animal o ropa.
7. Para obtener un buen empleo, se debe: a) Leer las recomendaciones de uso. b) Agitar en el estanque de aplicación antes de usar c) Usar el volumen de agua adecuado según dosis establecidas en la etiqueta.
8. Mantener fuera del alcance de los niños.
9. Suncrops, es un producto compatible con la mayoría de los agroquímicos, sin embargo se recomiendan pruebas de compatibilidad.

Cualquier duda por favor contactarse con el departamento técnico de Nutriprove S.A o Summit Agro Chile SpA.

Contenido Neto:

25 kgs



COMPOSICIÓN PRODUCTO CON REGISTRO ÓRGANICO

Caolín de uso agrícola	970	P/P
Polvo para aplicación en suspensión. Modo de acción: Foliar. Refinada, procesada y certificada.		

Suncrops es un protector de cultivo de última generación que forma una película mineral, que refleja la radiación UV, IR. Al aplicar el producto se forma una película traslúcida de baja cantidad de residuos.

Mejora la eficiencia del uso del agua, mejora los grados Brix / TSS, reduce el Aborto floral, reduce las cerezas siamesas, reduce el Stress Hídrico.

Genera frutos de mejor calidad, reduce la caída de frutos, reduce la alternancia de producción y mejora su fitosanidad.

La compañía garantiza la composición y contenido de este producto así como también la calidad dentro de la fecha de vencimiento. El almacenamiento y aplicación del producto es de exclusiva responsabilidad del usuario y la compañía no asume responsabilidad alguna por eventuales daños de cualquier naturaleza, derivadas de su inadecuado uso, manipulación o almacenaje.

El vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso, puesto que su aplicación debe ser determinada en cada caso particular por un profesional. El comprador asume absolutamente todos los riesgos de uso y manejo, procédase o no, de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

INSTRUCCIONES DE USO

Incompatibilidades: No mezclar con productos que contengan Clorothalonil ni Azufre. Para dudas consulte previamente con nuestro departamento técnico.

Aplicar asegurando un cubrimiento uniforme del cultivo tratado considerando volúmenes de mojamiento de 1.000-1.200 L/ha a una concentración de 1.25%. Para volúmenes mayores de mojamiento utilizar una dosis de 15 kg/ha.

CULTIVO	OBSERVACIONES GENERALES
Manzanos, Perales	Comenzar aplicaciones con fruta tamaño dedo pulgar realizando un programa de 6-8 aplicaciones por temporada cada 14-21 días según fenología y susceptibilidad varietal.
Nogales y Avellano europeo	Aplicar según las condiciones ambientales cada 14-21 días.
Vides	Realizar 2-3 aplicaciones en postcosecha cada 14-21 días según condiciones.
Cerezo, Ciruelo, Durazneros, Nectarines y Damascos	Aplicar inmediatamente terminada la cosecha, sin fruta presente. Realizar 2-3 aplicaciones cada 14-21 días. Aplicar asegurando un cubrimiento uniforme del cultivo considerando volúmenes de mojamiento de 1.000-1.200 L/ha a una concentración de 1.25%. Para volúmenes mayores de mojamiento utilizar una dosis de 15 kg/ha.
Cítricos Clementinos Limoneros, Mandarinos, Naranjos y Pomelos	Aplicar entre fines de flor hasta cuaja o durante el desarrollo de frutos realizando 4-5 aplicaciones por temporada hasta 60 días antes de la cosecha.
Paños	Aplicar entre fines de flor hasta cuaja o durante el desarrollo de frutos realizando 4-5 aplicaciones por temporada hasta 60 días antes de la cosecha.
Hortalizas (de hoja y de fruto)	6,25 kg/ha en el inicio al transplantar o justo antes de la floración. Aplicar nuevamente desde cuaja con intervalos de 14 a 21 días con una dosis de 12,5 kg/ha.
Papas	Aplicar cada 21 días desde 20 días post emergencia
Huertos Nuevos	Aplicar al 1,25 % una vez al mes desde el comienzo de las altas temperaturas. Si los mojamientos son bajos considerar dosis de 12 kg/ha

Fabricado por:

NUTRIPROVE S.A
www.nutriprove.com

Distribuido por:

SUMMIT AGRO CHILE SPA
Orinoco 90, Oficina 2002,
Las Condes, Santiago.

