

FITOSIL®. Es un bioestimulante, sellante y cicatrizante tópico, formulado a partir de extractos botánicos y minerales 100% naturales. Favorece y estimula los mecanismos de defensa y resistencia propios de la planta, fortaleciéndola frente a los efectos dañinos provocados por factores bióticos y abióticos desfavorables. Estimula y acelera la cicatrización frente a heridas y cortes de poda. Promueve la actividad metabólica y fisiológica alrededor de la zona tratada. Su formulación puede ser usada directamente. Su textura pastosa facilita la aplicación y la protección por un largo período. Genera una lámina indicadora de máxima adherencia y posee una alta vida de anaquel. No posee restricciones de aplicaciones fitosanitarias en pre y post tratamiento. Sus activos son biodegradables, no contaminan el medio ambiente y actúan durante la cicatrización de las heridas formándose posteriormente una capa protectora sobre el tejido.

COMPOSICIÓN (%)

Acarreador orgánico	20% p/p
Extractos de plantas Amaryllidáceas	35% p/p
Extractos de plantas Poáceas	40% p/p
SiO2	5% p/p

ELEMENTOS PRESENTES DERIVADOS DEL PROCESO (%)

Materia orgánica	25,1 %
Carbono orgánico	14,0 %
Nitrógeno total	1,3 %

INSTRUCCIONES DE USO

En frutales, pintar con FITOSIL® directamente sobre los cortes o heridas. En dosis de 5 a 10 litros/ hectárea. Aplicar inmediatamente después de efectuada la extirpación cubriendo la herida y alrededor de la zona tratada.

NO APLICAR CON LLUVIAS.

Cultivo	Objetivo de aplicación	Dosis (L/ha)	Observaciones
Frutales de carozo, Kiwi, Avellano, Pomáceas, Arándanos, Nogales y Vides.	Sellar heridas y estimular cicatrización.	5 – 10	Inmediatamente efectuada la labor pintar con Fitosil®, cubriendo por completo la zona tratada.

Mantenga en su envase original sellado, en ambiente fresco y seco.

CERTIFICACIONES Y REGISTROS 100% ORGÁNICO

CERO RESIDUOS

100% NATURAL

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES:

Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. No ingerir. Utilizar traje protector. Después de finalizada la aplicación, lavar con agua las partes del cuerpo que hayan entrado en contacto con el producto. No comer, beber o fumar durante su manipulación y/o aplicación. Mantener fuera del alcance de los niños y de personas ajenas a las labores de aplicación. En caso de ingestión trasladar al afectado a un centro de salud y mostrar la etiqueta al médico tratante. Los envases vacíos deben disponerse de acuerdo con las instrucciones de la autoridad competente

Agitar la mezcla constantemente durante su uso.

Preparación de la mezcla:

Agitar el envase antes de usar. La formulación permite su uso directo. **No diluir.**

ALMACENAJE: FITOSIL debe ser almacenado en su envase original sellado, en ambiente fresco y seco. No aplicar FITOSIL cuando exista pronóstico de lluvias.

NO MEZCLAR CON OTROS PRODUCTOS.

TIEMPO MÁXIMO DE ALMACENAJE: 2 años.

PERIODO DE CARENCIA: No posee.

TIEMPO DE REINGRESO: No hay restricción para el reingreso de personas o animales al área tratada.

Distribuido por:

Summit Agro Chile SpA

Orinoco 90, Piso 20, Oficina 2002,
Las Condes, Santiago.

SummitAgro
A Company of Sumitomo Corporation

Fabricado por:

Fitological Ltda.

Parcela 16, lote C, Panimávida,
Colbún.

FITOLOGICAL
FITOTECNOLOGIA SUSTENTABLE