

LEIMAY 20 % SC
FUNGICIDA

INFORMACIÓN GENERAL			
INGREDIENTE ACTIVO	AMISULBROM		
GRUPO QUÍMICO	Sulfamoil-triazoles		
NOMBRE QUÍMICO	3-(3-bromo-6-fluoro-2-metilindol-1-ilsulfonil)-N-N-dimetil-1H-1,2,4-triazol-1-sulfonamida.		
CONCENTRACIÓN	20 % p/v (200 g/L)		
FORMULACIÓN	Suspensión Concentrada (SC)		
MODO DE ACCIÓN	Translaminar y Preventivo		
FABRICANTE /FORMULADOR	Nissan Chemical Corporation, Japón		
DISTRIBUIDOR EN CHILE	Summit Agro Chile SpA		
TOXICIDAD	Grupo IV. Producto que normalmente no ofrece peligro		
ANTIDOTO	No se conoce antídoto específico		
AUTORIZACIÓN SAG Nº	2922		
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS			
<p>LEIMAY 20 % SC, es un fungicida translaminar con acción preventiva, recomendado para el control de Tizón Tardío (<i>Phytophthora infestans</i> A1). LEIMAY 20 % SC, actúa inhibiendo la respiración mitocondrial del hongo.</p>			
INSTRUCCIONES DE USO			
Cultivo	Enfermedad	Dosis (cc/ha)	Observaciones
Papas	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i> A1)	Floración: 450 - 600	Aplicar en forma preventiva, desde emergencia en adelante. Realizar máximo 4 aplicaciones durante la temporada, con un distanciamiento entre aplicaciones de 7 a 10 días. Utilizar volumen de agua que asegure la total cobertura del follaje de las plantas. Dependiendo del estado fenológico del cultivo, se recomienda el uso de mojamientos entre 150 y 450 L de agua/ha.
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA			
<p>Coloque agua en el estanque de aplicación hasta la mitad de su capacidad. Agitar el envase antes de su uso. En un recipiente aparte, diluya la cantidad necesaria de Leimay 20 % SC en un poco de agua. Vierta esta mezcla al estanque aplicador. Luego complete con agua a capacidad total. Durante el proceso de llenado y posterior aplicación, mantener el agitador funcionando constantemente.</p>			
COMPATIBILIDAD			
<p>Leimay 20 % SC es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Al realizar una mezcla no conocida, se recomienda efectuar una confirmación previa de compatibilidad y miscibilidad o consultar el Departamento Técnico de Summit Agro Chile.</p>			



INCOMPATIBILIDAD

Evitar mezclas con ácidos fuertes y productos alcalinos o fuertemente oxidantes. Al mezclar los productos, comprobar previamente su compatibilidad antes de agregarlos a la máquina pulverizadora. No mezclar con otros productos sin consultar previamente al Departamento Técnico de Summit Agro Chile.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las especies recomendadas, al ser aplicado de acuerdo a las instrucciones de su etiqueta y a las Buenas Prácticas Agrícolas.

PERÍODO DE CARENCIA

Papas: 5 días.

TIEMPO DE REINGRESO

Las personas no deben reingresar al área tratada antes de 4 horas después de realizada la aplicación, verificando que los depósitos de la aspersión se hayan secado sobre la superficie tratada. Para animales no corresponde debido a que los cultivos no se destinan a uso animal en pastoreo.

Advertencia: Aunque las informaciones y recomendaciones contenidas aquí están expuestas con el mejor de nuestros conocimientos y son consideradas correctas hasta la fecha del presente documento, no aceptaremos reclamaciones en cuanto a la exhaustividad o exactitud de las mismas. Este tipo de informaciones y recomendaciones no exoneran a las personas que reciban las mismas de tomar sus propias decisiones que sean convenientes para su preferente aplicación práctica. Ningún reclamo o exigencia de garantía ya sea expresa o implícita de cualquier tipo o naturaleza, podrá hacerse en relación con las informaciones o recomendaciones del producto al cual estas se refieren. **LEA SIEMPRE LA ETIQUETA DEL PRODUCTO ANTES DE LA APLICACIÓN DEL MISMO.**