



PROBORATE®

Aportador de Boro de Alta Asimilación



Fertilizante

Análisis Garantizado	% p/v
Boro (B ₂ O ₃)	14.0
Carbono Orgánico Oxidable Total	5.2

Solubilidad en agua: 100%, a 20 °C
 pH: 7.5
 Densidad: 1.12 g/mL, a 20 °C

Fecha de Caducidad: 3 años a partir de su formulación.

Contenido:

No. Lote

Fecha Formulación



Distribuido por:



SUMMIT - AGRO CHILE SpA
 Orinoco 90, Oficina 2002,
 Las Condes - Santiago
 Tel. (56 2) 24306300
 www.summit-agro.cl

Fabricado por:



Innovak Global, S.A. de C.V.
 Blvd. Vicente Lombardo Toledano #6615
 Col. Concordia Chihuahua, Chih. México C.P. 31375
 Tel. (614) 436-0138 Fax (614) 415-4770
 www.innovakglobal.com

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

Lea cuidadosamente las instrucciones de la etiqueta. Use el equipo de protección adecuado y completo: overol o camisa de manga larga y pantalón, mascarilla para polvos, lentes industriales, guantes y botas de hule. Después de una jornada de trabajo, báñese y use ropa limpia.

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.

“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA”.

“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”.

“LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.

“NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL”.

“EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO, LLEVE A LA PERSONA CON EL MÉDICO”.

“PRIMEROS AUXILIOS”

En caso de ingestión accidental: Enjuague la boca con abundante agua y suministre un alcali débil (bicarbonato de sodio).

En caso de contacto cutáneo: Quítese toda la ropa contaminada. Ponga la piel en contacto con agua corriente (ducha o manguera) en abundancia. Lave el área afectada con agua corriente y jabón, seque perfectamente la piel y póngase ropa limpia.

En caso de contacto ocular con el producto: Mantenga los párpados abiertos e inmediatamente lave el ojo con una corriente moderada de agua. Continúe lavando cuando menos por 15 minutos, si la irritación persiste consulte a su oftalmólogo.

“MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE”

“RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO”.

“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD”.

“RESPETE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS”.

“NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACÍOS DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”.

“NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO O AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”.

“NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”.

“NO VIERTA EL AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”.

“RESPETE LAS DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO”.

GARANTÍA: Innovak Global, S.A. de C.V. garantiza la composición y contenido publicada en esta etiqueta siempre y cuando el producto haya sido adquirido en un establecimiento autorizado y el envase de este producto cuente con su sello de seguridad, haya sido almacenado apropiadamente y se utilice antes de su fecha de expiración. Innovak Global, S.A. de C.V. garantiza la efectividad del producto siempre y cuando se sigan al pie de la letra las indicaciones de uso contenidas en esta etiqueta. Dado que el manejo, transporte, dosificación y aplicación de los productos están fuera de su control, Innovak Global, S.A. de C.V. no se hace responsable por efectos inesperados obtenidos como consecuencia del mal uso, dosificación equivocada, manejo errado o uso de productos expirados o mal conservados.

Metales Pesados	Menor a: (ppm)
Arsénico (As)	2.0
Cadmio (Cd)	2.5
Mercurio (Hg)	4.0
Plomo (Pb)	3.3

INSTRUCCIONES DE USO: SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

Proborate® es una formulación a base de extractos concentrados de cascarillas agrícolas **ECCA Carboxy®** y Boro, que previene y corrige desórdenes nutricionales ocasionados por deficiencia de este elemento. Por su composición se logra un eficaz ingreso a la planta.

Proborate® es un fertilizante foliar líquido de eficiente absorción, traslocación y metabolización en la planta. Ha sido diseñado para asperiones foliares preventivos y correctivos de la nutrición de Boro, mejorando íntegramente el metabolismo de la planta.

Proborate®, ayuda a mejorar la síntesis de compuestos estructurales a nivel de la membrana celular de la fruta, optimizando el flujo de azúcares y otros solutos. Por la baja concentración de Boro, es muy seguro y eficaz para aplicarlo en cualquier momento del ciclo de desarrollo de la planta. No produce ni mancha ni russet.

USO:

Proborate® debe ser aplicado por asperión foliar mezclado con suficiente agua para lograr una adecuada cobertura del cultivo.

Para preparar la solución de asperión con agua agite el envase, desenrosque la tapa y retire el sello de seguridad; mida la cantidad a aplicar en probeta o recipiente graduado y vierta en cubeta para premezcla, diluya completamente y finalmente vierta en el estanque de la aspersora conteniendo la mitad del volumen de agua, agite y complete el total del volumen de asperión.

DOSIS:

Cultivo	Dosis (L/ha)	N° de aplicaciones	Concentración (cc/100 L de agua)	Momento de aplicación
Vides de mesa y Vides para vino.	1-3	2	100	* 10 días antes de floración y hasta inicio de flor. * Post cosecha.
Manzanas, Perales y Carozos	1-3	2	100	* Botón floral y hasta inicio de floración. * Post cosecha.
Frutales de nuez	1-2	2	100	* Inicio de floración. * Caída de amentos.
Cítricos	1-3	2	100	* Botón floral verde. * Crecimiento vegetativo de primavera (Octubre).
Paltos	1-3	2	100	* Panícula floral expuesta. * Inicio de floración.
Kiwi y Berries	1-2	2	100	* 10 días antes de floración y hasta inicio de flor. * Post cosecha.
Olivo	1-3	2	100	* 15 días antes de floración. * 10 días antes de floración y hasta inicio de flor.
Tomate, Aji, Pimientos	1-2	2	200	* Iniciar con los primeros racimos florales cuajados. * Repetir a los 7 – 10 días.
Cucurbitáceas	1-2	2	200	* Iniciar antes de floración. * Repetir a los 7 – 10 días.
Brásicas	1-2	2	200	* A partir de las primeras 2 hojas verdaderas formadas. * Repetir a los 7 – 10 días.
Cebollas Ajos	1-1,5	2	200	* A partir de las primeras 2 hojas verdaderas formadas. * Repetir a los 7 – 10 días.
Papas	1-1,5	2	200	* Iniciar antes de floración. * Repetir a los 7 a 10 días.

COMPATIBILIDAD:

No mezclar con productos alcalinos ni ácidos. Al realizar una mezcla no conocida, se recomienda efectuar una confirmación previa de compatibilidad y miscibilidad o consultar a nuestro departamento Técnico.

ATENCIÓN A CLIENTES



+52 614 436 00 66
+56 2 2430 6300

PROBORATE®