

DANJIRI 10% SC
FUNGICIDA

INFORMACIÓN GENERAL			
INGREDIENTE ACTIVO	ETABOXAM		
GRUPO QUÍMICO	Tiazolcarboxamidas		
NOMBRE QUÍMICO	(RS)-(α-ciano-2-tenil)-4-etil-2-(etilamino)-5-tiazolcarboxamida		
CONCENTRACIÓN	10% p/v (100 g/L)		
FORMULACIÓN	Suspensión Concentrada (SC)		
MODO DE ACCIÓN	Translaminar y sistémica		
FABRICANTE /FORMULADOR	SummitAgro Argentina		
DISTRIBUIDOR EN CHILE	Summit Agro Chile SpA		
TOXICIDAD	Grupo IV. Producto que normalmente no ofrece peligro		
ANTIDOTO	No se conoce antídoto específico.		
AUTORIZACIÓN SAG N°	2773		
PRINCIPALES CARACTERISTICAS			
<p>DANJIRI 10%SC es un fungicida que posee acción translaminar y sistémica, recomendado para el control de enfermedades fungosas en papas.</p>			
INSTRUCCIONES DE USO			
Cultivo	Enfermedad	Dosis (L/ha)	Observaciones (*)
Papas	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i> A1)	0,75 – 1,5	Aplicar en forma preventiva según las condiciones predisponentes de la enfermedad, en forma alternada con otros fungicidas a intervalos de 7 a 10 días. Utilizar en un programa que incluya productos de diferente modo de acción. Volumen de agua mínimo:400 L/ha
Aplicación Aérea			
Cultivo	Enfermedad	Dosis (L/ha)	Observaciones (*)
Papas	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i> A1)	0,75 – 1,5	Aplicar en forma preventiva según las condiciones predisponentes de la enfermedad, en forma alternada con otros fungicidas a intervalos de 7 a 10 días. Utilizar en un programa que incluya productos de diferente modo de acción. Volumen da agua mínimo: 40 L/ha
(*) Utilice la dosis mayor cuando la presión de la enfermedad sea alta. Utilice las dosis menores en mezcla con fungicidas de contacto como Mancozeb y Clorotalonil con el mínimo intervalo de aplicación.			
(*) Aplicaciones: máximo 4 por temporada.			
APLICACION			
<p>Para aplicación terrestre, DANJIRI 10% SC puede ser aplicado con cualquier equipo pulverizador (por vía líquida), empleado agua limpia y en un volumen de agua que asegure una adecuada cobertura del follaje, evitando el escurrimiento de líquido), empleando agua limpia y en un volumen de agua que asegure una adecuada cobertura del follaje, evitando el escurrimiento de líquido de la pulverización al suelo. No aplique a las plantas bajo condiciones de estrés como sequia o inundaciones.</p>			

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Llene el estanque hasta la mitad, haga una premezcla con la cantidad de **DANJIRI 10%SC** necesaria y agitando complete el volumen de agua necesario.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con plaguicidas a base de Mancozeb, Clorotalonil y Captan, formulados como polvos mojables, con herbicidas, insecticidas comúnmente usados. Sin embargo como es imposible conocer la compatibilidad de **DANJIRI 10% SC** con todos los productos del mercado, no se asume ninguna responsabilidad por mezclas hechas con otros productos que no sean mencionados específicamente en esta ficha técnica y/o en la etiqueta. Antes de realizar una mezcla, se recomienda efectuar una prueba de compatibilidad.

INCOMPATIBILIDAD

DANJIRI 10% SC, es incompatible con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

DANJIRI 10% SC, no presenta Fitotoxicidad en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

PERÍODO DE CARENCIA

Papa: 7 días

TIEMPO DE REINGRESO

Las personas no deben reingresar al área tratada hasta pasadas 2 horas después de la aplicación, verificando que la aspersion se haya secado sobre la superficie tratada, a menos que se utilice ropa e implementos de protección. No corresponde establecer periodos de reingreso para los animales por el tipo de cultivo al cual se aplica el producto.

OTRAS INFORMACIONES

El uso reiterado de fungicidas del grupo FRAC U5 al cual pertenece **DANJIRI 10% SC**, puede llevar a la selección natural de biotipos resistentes en algunas especies. Estos biotipos resistentes pueden llegar a ser dominantes por el uso repetido de este tipo de fungicidas del grupo FRAC U5, por lo que su nivel de control se puede ver afectado. Como una estrategia anti-resistencia es recomendable alternar la aplicación de **DANJIRI 10% SC** con otros fungicidas de diferentes grupos químicos y/o modos de acción. La aparición de poblaciones resistentes es difícil de detectar antes de la aplicación de **DANJIRI 10% SC**, por lo que

Summit Agro Chile SpA, no se hace responsable por pérdidas sufridas debido a la falta de control de estas poblaciones resistentes. En caso de duda consultar con nuestro Departamento Técnico, o al especialista de su confianza. Debido a la naturaleza variable de los factores que inciden en la aplicación de este producto, no se da garantía de ninguna clase con respecto a sus efectos. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación.

Advertencia: Aunque las informaciones y recomendaciones contenidas aquí están expuestas con el mejor de nuestros conocimientos y son consideradas correctas hasta la fecha del presente documento, no aceptaremos reclamaciones en cuanto a la exhaustividad o exactitud de las mismas. Este tipo de informaciones y recomendaciones no exoneran a las personas que reciban las mismas de tomar sus propias decisiones que sean convenientes para su preferente aplicación práctica. Ningún reclamo o exigencia de garantía ya sea expresa o implícita de cualquier tipo o naturaleza, podrá hacerse en relación con las informaciones o recomendaciones del producto al cual estas se refieren. **LEA SIEMPRE LA ETIQUETA DEL PRODUCTO ANTES DE LA APLICACIÓN DEL MISMO.**