

MERIT® BLUE

FERTILIZANTE

INFORMACIÓN GENERAL																																		
INGREDIENTE ACTIVO	Nitrógeno total (Nitrógeno amoniacal y Nitrógeno nitrato), fósforo, potasio, manganeso, boro, hierro, cobre, zinc, molibdeno.																																	
CONCENTRACIÓN	<table border="0"> <tr> <td>Nitrógeno (total)</td> <td>.....</td> <td>9,11% p/v</td> </tr> <tr> <td> Nitrógeno Amoniacal</td> <td>.....</td> <td>5,09 p/v</td> </tr> <tr> <td> Nitrógeno nítrico</td> <td>.....</td> <td>4,02 p/v</td> </tr> <tr> <td>Fósforo</td> <td>.....</td> <td>6,38 p/v</td> </tr> <tr> <td>Potasio</td> <td>.....</td> <td>3,95 p/v</td> </tr> <tr> <td>Manganeso</td> <td>.....</td> <td>0,11 p/v</td> </tr> <tr> <td>Boro</td> <td>.....</td> <td>0,09 p/v</td> </tr> <tr> <td>Hierro</td> <td>.....</td> <td>0,09 p/v</td> </tr> <tr> <td>Cobre</td> <td>.....</td> <td>0,06 p/v</td> </tr> <tr> <td>Zinc</td> <td>.....</td> <td>0,06 p/v</td> </tr> <tr> <td>Molibdeno</td> <td>.....</td> <td>0,10 p/v</td> </tr> </table>	Nitrógeno (total)	9,11% p/v	Nitrógeno Amoniacal	5,09 p/v	Nitrógeno nítrico	4,02 p/v	Fósforo	6,38 p/v	Potasio	3,95 p/v	Manganeso	0,11 p/v	Boro	0,09 p/v	Hierro	0,09 p/v	Cobre	0,06 p/v	Zinc	0,06 p/v	Molibdeno	0,10 p/v
Nitrógeno (total)	9,11% p/v																																
Nitrógeno Amoniacal	5,09 p/v																																
Nitrógeno nítrico	4,02 p/v																																
Fósforo	6,38 p/v																																
Potasio	3,95 p/v																																
Manganeso	0,11 p/v																																
Boro	0,09 p/v																																
Hierro	0,09 p/v																																
Cobre	0,06 p/v																																
Zinc	0,06 p/v																																
Molibdeno	0,10 p/v																																
FORMULACIÓN	Producto líquido																																	
MODO DE ACCIÓN	Aplicación foliar.																																	
FABRICANTE /FORMULADOR	Seikaken Inc. 312-4 Toriko, Nishihara mura, Aso gun, Kumamoto 861-2401 – JAPÓN																																	
DISTRIBUIDOR EN CHILE	Summit Agro Chile SpA.																																	
TOXICIDAD	Producto no tóxico																																	
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS																																		
<p>MERIT® BLUE es un fertilizante en base a minerales de formulación líquida a base de nitrógeno, fósforo, potasio y otros elementos secundarios como manganeso, boro y otros. MERIT® BLUE al ser aplicado al cultivo ayuda a completar el proceso fisiológico de la dormacia, permitiendo una uniformidad de la brotación, floración y cuaja, lo cual logra una mayor eficiencia al implementar los programas los programas fitosanitarios. Asperjando a la planta MERIT® BLUE mejora la producción: aumenta y homogeneiza.</p>																																		
INSTRUCCIONES DE USO																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CULTIVOS</th> <th>CONCENTRACIÓN L/ha</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cerezos</td> <td>4 a 5 (mínimo recomendado 40 L/ha)</td> <td>Aplicar entre 30 y 40 días antes de la fecha normal de apertura de yemas. Se sugiere utilizar un volumen de agua de 1.000 L o aquel que permita un correcto cubrimiento de las yemas. Realizar una aplicación por temporada.</td> </tr> <tr> <td>Vides</td> <td>3 a 5 (mínimo recomendado 30 L/ha)</td> <td>Aplicar entre 20 y 10 días antes de la fecha normal de inicios de brotación. Se sugiere utilizar un volumen de agua entre 800 y 1.000 L o aquel que permita un correcto cubrimiento.</td> </tr> </tbody> </table>			CULTIVOS	CONCENTRACIÓN L/ha	OBSERVACIONES	Cerezos	4 a 5 (mínimo recomendado 40 L/ha)	Aplicar entre 30 y 40 días antes de la fecha normal de apertura de yemas. Se sugiere utilizar un volumen de agua de 1.000 L o aquel que permita un correcto cubrimiento de las yemas. Realizar una aplicación por temporada.	Vides	3 a 5 (mínimo recomendado 30 L/ha)	Aplicar entre 20 y 10 días antes de la fecha normal de inicios de brotación. Se sugiere utilizar un volumen de agua entre 800 y 1.000 L o aquel que permita un correcto cubrimiento.																							
CULTIVOS	CONCENTRACIÓN L/ha	OBSERVACIONES																																
Cerezos	4 a 5 (mínimo recomendado 40 L/ha)	Aplicar entre 30 y 40 días antes de la fecha normal de apertura de yemas. Se sugiere utilizar un volumen de agua de 1.000 L o aquel que permita un correcto cubrimiento de las yemas. Realizar una aplicación por temporada.																																
Vides	3 a 5 (mínimo recomendado 30 L/ha)	Aplicar entre 20 y 10 días antes de la fecha normal de inicios de brotación. Se sugiere utilizar un volumen de agua entre 800 y 1.000 L o aquel que permita un correcto cubrimiento.																																
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA																																		
<p>Al momento de aplicar, se recomienda utilizar un turbopulverizador para garantizar uniformidad en la distribución del mojamiento. Agitar siempre el envase con el producto antes de utilizar.</p> <p>MERIT® BLUE puede ser utilizado con surfactantes siliconados que ayuden a mejorar el cubrimiento en los cultivos.</p>																																		

COMPATIBILIDAD
Debido a su pH y composición MERIT® BLUE puede mezclarse con la mayoría de los abonos y fitosanitarios. En cualquier caso, se recomienda realizar siempre una prueba previa de compatibilidad.
INCOMPATIBILIDAD
Evite la mezcla de MERIT® BLUE con productos de reacción alcalina y fertilizantes cálcicos. Se recomienda hacer una prueba previa de incompatibilidad. En caso de dudas realizar una prueba previa a la aplicación y/o consultar a nuestro Departamento Técnico.
FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico a las especies recomendadas, al ser aplicado de acuerdo con las instrucciones de su etiqueta y a las Buenas Prácticas Agrícolas.
PRECAUCIONES
Debe protegerse de temperaturas extremas. Almacenamiento óptimo en un intervalo de 5 - 40 °C. Mantener el envase en lugar fresco y aireado, sin exponer al sol. No coma, beba o fume durante las aplicaciones. Evitar el contacto con la piel, respirar o ingerir producto durante la aspersión, usar traje protector, guantes de caucho, máscara y lentes protectores. Cambiarse la ropa que ha estado en contacto con el producto; lávela con agua y jabón después de cada uso. Lávese bien las partes contaminadas con agua y jabón después de la aplicación.

Advertencia: Aunque las informaciones y recomendaciones contenidas aquí están expuestas con el mejor de nuestros conocimientos y son consideradas correctas hasta la fecha del presente documento, no aceptaremos reclamaciones en cuanto a la exhaustividad o exactitud de las mismas. Este tipo de informaciones y recomendaciones no exoneran a las personas que reciban las mismas de tomar sus propias decisiones que sean convenientes para su preferente aplicación práctica. Ningún reclamo o exigencia de garantía ya sea expresa o implícita de cualquier tipo o naturaleza, podrá hacerse en relación con las informaciones o recomendaciones del producto al cual estas se refieren. **LEA SIEMPRE LA ETIQUETA DEL PRODUCTO ANTES DE LA APLICACIÓN DEL MISMO.**

Ficha Técnica
válida para Chile