

AMINOKIPPO®

FERTILIZANTE

INFORMACIÓN GENERAL			
INGREDIENTE ACTIVO	Nitrógeno total (Nitrógeno amoniacal y Nitrógeno nitrato), fósforo y potasio.		
CONCENTRACIÓN	Nitrógeno total..... 8,2% p/v (7 % p/p) Nitrógeno amoniacal..... 4% p/v (3,4 % p/p) Nitrógeno nitrato3,9% p/v (3,3 % p/p) Fósforo (P ₂ O ₅) 3,5% p/v (3,0 % p/p) Potasio..... 3,5% p/v (3,0 % p/p)		
FORMULACIÓN	Producto líquido		
MODO DE ACCIÓN	Aplicación edáfica por fertirriego o <i>drench</i> .		
FABRICANTE /FORMULADOR	Seikaken Inc. 312-4 Toriko, Nishihara mura, Aso gun, Kumamoto 861-2401 – JAPÓN		
DISTRIBUIDOR EN CHILE	Summit Agro Chile SpA.		
TOXICIDAD	Producto no tóxico		
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS			
<p>AMINOKIPPO® es un regenerador edáfico que está compuesto por un polímero orgánico que, al entrar en contacto con las partículas de arcilla del suelo, genera una reacción electrostática que hace que éstas se junten rápidamente formando agregados, modificando así la estructura del suelo. Esto crea un ambiente propicio para el desarrollo de la raíz, ya que entre estos agregados se facilita la circulación de aire y agua y los nutrientes del suelo quedan más disponibles para la planta. AMINOKIPPO® contiene además aminoácidos y nutrientes (N-P-K) que aportan al desarrollo del cultivo.</p>			
INSTRUCCIONES DE USO			
CULTIVOS	DOSIS L/ha	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS DE APLICACIÓN
Cerezos, Ciruelos, Duraznos, Nectarines, Damascos.	3 a 4	De 1 a 3 aplicaciones, de acuerdo con el grado de compactación del suelo, con intervalos de 15 a 20 días. El producto puede ser aplicado en cualquier momento fenológico del cultivo, sin embargo, la recomendación ideal es aplicarlo inmediatamente antes del inicio del crecimiento de raíces.	Aplicación edáfica mediante <i>drench</i> , con un volumen de agua de 1 litro por planta o mediante inyección por riego por goteo.
Manzanos, Perales,			
Avellano, Nogal, Almendros.			
Vides, Kiwi, Limones, Naranjos, Mandarinos, Pomelos, Tangelos, Clementinas, Olivo, Paltos y Granados			
Arándanos, Frambuesas, Frutillas, Moras, Grosellas, Zarparrillas.			

<p>Hortalizas; Lechugas, Endibia, Repollo, Apio, Achicoria, Brócoli, Coliflor, Zanahorias, Alcachofas, Pepinos, Melones, Sandías, Pimientos y Tomates, Cebolla, Ajo.</p>	<p>3 a 4</p>	<p>De 1 a 3 aplicaciones, de acuerdo con el grado de compactación del suelo, con intervalos de 15 a 20 días. La primera aplicación de pre-trasplante incorporado o inmediatamente realizado el trasplante, vía foliar o mediante riego por goteo.</p>	<p>Aplicación mediante incorporación al suelo mediante rastra o riego por goteo. También puede ser aplicado al follaje inmediatamente realizado el trasplante. Se recomienda utilizar un volumen de agua de 200 a 400 L/ha.</p>
--	--------------	---	---

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Recomendaciones para aplicación vía goteo: En frutales a capacidad de campo, se recomienda aplicar 1 día después del riego, durante una hora. Posterior a la inyección del producto, realizar un posterior lavado del sistema.

En hortalizas se recomienda inyectar el producto en la segunda mitad del riego y con un posterior lavado del sistema, ejemplo: 1 hora de riego, 1 hora de inyección de **AMINOKIPPO®** y 30 minutos de lavado.

COMPATIBILIDAD

Debido a su pH y composición **AMINOKIPPO®** puede mezclarse con la mayoría de los abonos y fitosanitarios. En cualquier caso, se recomienda realizar siempre una prueba previa de compatibilidad.

INCOMPATIBILIDAD

Evite la mezcla de **AMINOKIPPO®** con productos de reacción alcalina y fertilizantes cálcicos. Se recomienda hacer una prueba previa de incompatibilidad. En caso de dudas realizar una prueba previa a la aplicación y/o consultar a nuestro Departamento Técnico.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las especies recomendadas, al ser aplicado de acuerdo con las instrucciones de su etiqueta y a las Buenas Prácticas Agrícolas.

PRECAUCIONES

Debe protegerse de temperaturas extremas. Almacenamiento óptimo en un intervalo de 5 - 40 °C. Mantener el envase en lugar fresco y aireado, sin exponer al sol.

No coma, beba o fume durante las aplicaciones. Evitar el contacto con la piel, respirar o ingerir producto durante la aspersión, usar traje protector, guantes de caucho, máscara y lentes protectores. Cambiarse la ropa que ha estado en contacto con el producto; lávela con agua y jabón después de cada uso. Lávese bien las partes contaminadas con agua y jabón después de la aplicación.

Advertencia: Aunque las informaciones y recomendaciones contenidas aquí están expuestas con el mejor de nuestros conocimientos y son consideradas correctas hasta la fecha del presente documento, no aceptaremos reclamaciones en cuanto a la exhaustividad o exactitud de las mismas. Este tipo de informaciones y recomendaciones no exoneran a las personas que reciban las mismas de tomar sus propias decisiones que sean convenientes para su preferente aplicación práctica. Ningún reclamo o exigencia de garantía ya sea expresa o implícita de cualquier tipo o naturaleza, podrá hacerse en relación con las informaciones o recomendaciones del producto al cual estas se refieren. **LEA SIEMPRE LA ETIQUETA DEL PRODUCTO ANTES DE LA APLICACIÓN DEL MISMO.**

Ficha Técnica
válida para Chile