

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

**Bactericida y Fungicida Biológico en base a esporas de la cepa N4 de la bacteria *Brevibacillus parabrevis*, a esporas de la cepa N5 de la bacteria *Bacillus subtilis*, a esporas de la cepas N6 y N7 de la bacteria *Bacillus cereus*.**

**Para su seguridad en la preparación:** Evite el contacto con la piel, ojos y vestimenta, así como su ingestión. Use guantes impermeables, botas de goma, overol impermeable, mascarilla para polvos y protector facial; aleje animales domésticos y personas extrañas.

**Para su seguridad durante la aplicación:** Evite el contacto con la piel, ojos y vestimenta, así como su ingestión. Use guantes impermeables, botas de goma, overol impermeable, use antiparras y máscara con filtro. Aleje animales domésticos y personas extrañas. No trabaje en la niebla generada al pulverizar el producto, no aplique con viento.

**Para su seguridad después de la aplicación:** Lávese después del trabajo y antes de comer. Cámbiese y lave la ropa de trabajo antes de volver a usarla.

**Síntomas de Intoxicación:** En caso de ingestión, posible diarrea; en caso de contacto con piel u ojos, posible irritación.

### PRIMEROS AUXILIOS

**Primeros Auxilios:** En todos los casos que se presenten a continuación, se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de salud a cargo.

**EN CASO DE INGESTIÓN: NO INDUCIR VÓMITO.** Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente al centro asistencial.

**EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar.

**EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, además los lentes no deberán utilizarse nuevamente.

**EN CASO DE INHALACION:** Traslade al paciente al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Llevar a un centro asistencial de inmediato.

**ANTÍDOTO:** No posee antídoto específico.

### TRATAMIENTO MÉDICO:

**TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA:** CAB de reanimación. Evaluar realizar lavado gástrico, seguido de administración de carbón activado. El tratamiento posterior es sintomático y de soporte.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.**

**LOS ENVASES INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.**

**LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.**

**NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.**

**NO LAVAR LOS ENVASES O LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO.**

**No es tóxico a organismos acuáticos, aves, animales ni abejas.**

**No asperjar, verter, o eliminar el producto o sus envases en fuentes o cursos de agua.**

**Almacenaje:** Nacillus Pro® debe ser almacenado en su envase original sellado, en un ambiente fresco y seco. Tiempo máximo de almacenaje 24 meses.

### Teléfonos de Emergencia.

**CITUC EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS FONO: +56-2-26353800**

**CITUC EMERGENCIAS QUÍMICAS FONO: +56-2-22473600 - ATENCIÓN LAS 24 HORAS.**

**Bio Insumos Nativa SpA. (+56-71) 2970696/2970698.**

## NACILLUS PRO®

**BACTERICIDA—FUNGICIDA BIOLÓGICO  
POLVO MOJABLE (WP)**

**NACILLUS PRO®** es un bactericida fungicida biológico de acción preventiva, compuesto por cepas nativas de los biocontroladores *Bacillus spp.* y *Brevibacillus brevis*. Con acción sobre bacterias y hongos fitopatógenos, según cuadro de instrucciones de uso.

### COMPOSICIÓN

(% p/p)

<i>Brevibacillus parabrevis</i> cepa N4*	0.7525 (7,5 g/kg)
<i>Bacillus subtilis</i> cepa N5**	0.7525 (7,5 g/kg)
<i>Bacillus cereus</i> cepa N6***	0.7525 (7,5 g/kg)
<i>Bacillus cereus</i> cepa N7***	0.7525 (7,5 g/kg)
Coformulantes c.s.p	100 (1 kg)

\*La concentración de cepa es de  $2,5 \times 10^7$  UFC/g

\*\*La concentración de cepa es de  $2,5 \times 10^7$  UFC/g

\*\*\*La concentración de cepa es de  $2,5 \times 10^7$  UFC/g

\*\*\*\*La concentración de cepa es de  $2,5 \times 10^7$  UFC/g

## LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

**Fabricado por Bio Insumos Nativa SpA**  
Parcela Antihue Lote 4 B2, Maule, Chile  
Fono: +56-71-2970696  
Casilla 6 Maule/ventas@bionativa.cl |  
www.bionativa.cl



**Distribuido por Summit-Agro Chile SpA**  
Apoquindo 5400, Oficina 1801-B,  
Las Condes, Santiago, Chile.



**Autorización del Servicio Agrícola  
Ganadero N° 2.913-0**

**AUTORIZADO PARA SU USO EN  
AGRICULTURA ORGÁNICA**

**CANTIDAD                      LOTE                      VENCIMIENTO**

® Marca registrada de Bio Insumos Nativa SpA

**NO INFLAMABLE • NO CORROSIVO • NO EXPLOSIVO**



# CUIDADO

## INSTRUCCIONES DE USO

### "AUTORIZADO PARA USO EN AGRICULTURA ORGÁNICA NACIONAL"

**Generalidades:** Las cepas de *Bacillus spp.* y *Brevibacillus* utilizadas presentan acción bactericida y fungicida a través de competencia y antibiosis de bacterias fitopatógenas, logrando un control de las enfermedades Pudrición acuosa en Ajo; Pudrición acuosa en Clavel; Alternaria en Tomate industrial; Sarna del manzano en Manzano; Oídio en Vid y Mildiu en Melón; tal como se observa en el cuadro "Instrucciones de uso". La formulación de **Nacillus Pro**® está compuesta por endosporas, las que son reconocidas en la naturaleza como estructuras de alta resistencia pudiendo soportar altas temperaturas y falta absoluta de humedad por períodos prolongados.

Cultivos	Enfermedad/Patógeno	DOSIS (g/hL ó 100 L)	Observaciones
Vid	Oídio ( <i>Erysiphe necator</i> )	30	Aplicación de forma preventiva, para condiciones de bajo riesgo de infección. Mojamiento de 1000 L/ha. Repetir aplicación, según presión de la enfermedad, en un periodo no superior a 10 días.
		60	Aplicación de forma preventiva, para condiciones de alto riesgo de infección. Mojamiento de 1000 L/ha. Repetir aplicación, según presión de la enfermedad, en un periodo no superior a 10 días.
		120	Aplicación en forma curativa, en presencia de micelio activo del patógeno. Mojamiento de 1000 L/ha. Repetir aplicación, según presión de la enfermedad, en un periodo no superior a 10 días.
Manzano	Sarna del manzano ( <i>Venturia inaequalis</i> )	30	Aplicación de forma preventiva, para condiciones de bajo riesgo de infección. Mojamiento de 1000 L/ha.
		60	Aplicación de forma preventiva, para condiciones de alto riesgo de infección. Mojamiento de 1000 L/ha.
		120	Aplicación en forma curativa, en presencia de micelio activo del patógeno. Mojamiento de 1000 L/ha.
Tomate industrial	Alternaria ( <i>Alternaria alternata</i> )	300	No existe un límite máximo de aplicaciones por temporada, por lo cual, cuando exista presencia de la enfermedad en cultivo, se recomienda iniciar aplicaciones cada 7 días hasta que cesen los síntomas. Mojamientos de 300 l/ha.
Melón	Mildiu ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	300	Aplicación para etapas tempranas con un bajo nivel de infección. No existe un límite máximo de aplicaciones por temporada, se recomienda iniciar aplicaciones cada 5 días hasta que cesen los síntomas de la enfermedad. Mojamientos de 350 l/ha.
		600	Aplicación para grados moderados de infección. No existe un límite máximo de aplicaciones por temporada, se recomienda iniciar aplicaciones cada 5 días hasta que cesen los síntomas de la enfermedad. Mojamientos de 350 l/ha.
Ajo	<i>Erwinia spp.</i>	300	Aplicado como drenching en plantación con un mojamiento de 400 l/ha. Repetir a los 30 días.
Clavel	Pudrición acuosa <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i>	300	Aplicado como drenching en plantación con un mojamiento de 400 l/ha. Repetir a los 30 días.

**Preparación de la mezcla:** Disolver la cantidad necesaria de **Nacillus Pro**® en un balde con agua, agitando enérgicamente, luego verter en el equipo de aplicación que previamente ha sido llenado hasta la mitad; agitar y terminar de llenar. Mantener con agitación constante. Use mascarilla para polvos durante la aplicación. **Incompatibilidad:** Incompatibilidad para aplicaciones conjuntas con compuestos cúpricos y antibióticos. No mezclar **Nacillus Pro**® con otros plaguicidas sin realizar antes una prueba de compatibilidad. Consultar lista de compatibilidad con el fabricante. **Fitotoxicidad:** No presenta fito toxicidad en los cultivos recomendados. **Período de Carencia:** No tiene. **Tiempo de Reingreso al área tratada:** Se recomienda reingresar al área tratada cuando el producto se encuentre seco, aproximadamente en dos horas, en el caso de seres humanos. En animales, no corresponde, ya que estos cultivos no son de consumo animal.

