

FOSFIREND®

FERTILIZANTE FOLIAR

SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

FOSFIREND es un producto biodegradable y no contaminante, cuyos ingredientes activos son los elementos **fósforo** y **potasio** quelatados con un biopolímero natural obtenido de la caparazón de los crustáceos, con efecto nutritivo de liberación controlada y fortalecimiento de la planta, para aplicación en Vides, Frutales y Hortalizas en general. (www.biorend.cl)

COMPOSICIÓN*		
Poli-(2-desoxi-2-amino-D-glucosa)		1,7 % p/v
Fósforo (P ₂ O ₅)		9,0 % p/v
Potasio (K ₂ O)		8,2 % p/v
Inertes	c.s.p.c.	93,1 % p/v

*Un litro corresponde a 1,12 kg de Producto

NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO - NO INFLAMABLE
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

AGITAR EL ENVASE ANTES DE ABRIRLO

FABRICANTE

Bioagro S.A.

Santiago, Chile



DISTRIBUIDOR

Summit Agro Chile SpA
 Ormeco 90, Oficina 2002, Piso 20,
 Las Condes, Santiago de Chile
 Teléfono: +56 22 430 6300
 ventas@summit-agro.cl



Contenido Neto: 20 litros

Lote de Fabricación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido de metales pesados:

Arsénico (As): 12 mg/kg Mercurio (Hg): <3 mg/kg
 Cadmio (Cd): 1 mg/kg Plomo (Pb): <1 mg/kg

Contenido de microorganismos:

Escherichia coli: Ausencia. *Salmonella*: Ausencia.

INSTRUCCIONES DE USO

FOSFIREND: es un producto único que contiene poli-(2-desoxi-2-amino-D- glucosa), fósforo y potasio. El fósforo, es clave en todas las reacciones de transferencia energética en la planta y el potasio es clave en la regulación osmótica y por lo tanto en el transporte de azúcares.

Cultivo	Dosis (L/Ha) o Solución (%)	Número de Aplicaciones	Momento de Aplicación	Forma de aplicación
Vid de Mesa, Vid Vinífera y Vid Pisquera	5 - 7	3 a 6	A partir de brotes de 20 cm, cada 15 días. A partir de post shatter 5 a 8 mm, repetir 4 a 5 veces cada 7 a 10 días.	Asperjado foliarmente
Kiwi	5 - 7	3 a 6	Con brotes en activo crecimiento (primavera y otoño) cada 15 días.	
Nogal	5 - 7	3 a 6	Desde flor pistilada en adelante cada 7 a 15 días.	
Avellano y Castaño	5 - 7	3 a 6	Comenzar en el periodo de fecundación cada 10 días.	
Palto	5 - 7	3 a 6	Desde racimo coliflor (floración), repetir cada 7 a 15 días.	
Olivo	5 - 7	3 a 6	Desde inicio de cuaja de frutos.	
Clementinas, Limonero, Naranja, Pomelos y Tangelos	5 - 7	3 a 6	Inicio de floración, repetir de 7 a 15 días.	
Almendro y Cerezo	5 - 7	3 a 6	Desde fruto recién cuajado, repetir cada 7 a 10 días.	
Ciruelo, Damasco, Duraznero, y Nectarino	5 - 7	3 a 6	Desde fruto recién cuajado, repetir cada 7 a 10 días.	
Manzano y Peral	5 - 7	3 a 6	Desde caída de pétalos, cada 15 días.	
Arándano, Frambuesa, Frutilla, Grosellas, Mora y Zarparrillas	5 - 7	3 a 6	Antes y después de floración, cada 7 a 15 días.	
Acelga, Achicoria, Espinaca, Lechuga y Repollo	0,5% - 1%	3 a 6	A partir de 15 días después del trasplante, cada 7 a 15 días.	
Melón, Pepino, Sandía y Zapallo	0,5% - 1%	3 a 6	A partir de 15 días después del trasplante, cada 7 a 15 días.	
Brócoli y Coliflor	0,5% - 1%	3 a 6	A partir de 7 a 10 días post trasplante, cada 10 días.	
Ají, Pimentón y Tomate	0,5% - 1%	3 a 6	Desde inicio de floración, cada 7 a 15 días.	
Papas	0,5% - 1%	3 a 6	A partir de 10 cm de brote, cada 15 días.	
Ajo y Cebolla	0,5% - 1%	3 a 6	A partir de formación de 6ta a 7ma hoja.	

Almacenar FOSFIREND en un lugar fresco y seco y se debe AGITAR EL ENVASE MUY BIEN antes de abrirlo.

Regulación del pH de la dilución: Al aplicar FOSFIREND debe tomarse precaución que el agua utilizada tenga un pH entre 5,5 y 6,5 para evitar precipitación del ingrediente activo. En caso de que el agua tenga un pH superior a 6,5 se debe añadir en forma previa a la dilución un regulador de pH.

Compatibilidades: Antes de hacer mezclas definitivas, hacer pre-mezclas proporcionales en volúmenes pequeños para verificar compatibilidades. El producto debe ser aplicado por personal idóneo y bajo las indicaciones establecidas de aplicación y seguridad.

Preparación de las diluciones: Llenar el estanque de aplicación a la mitad de su capacidad y posteriormente agregar FOSFIREND con el sistema de agitación funcionando y luego completar con agua el volumen restante.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo: Fertilizantes Foliare

• Conservar y comercializar este producto sólo en su envase original.

• Transportar y mantener este envase bien cerrado, bajo llave, alejado de fuentes de calor y humedad. Almacenar en recintos exclusivos para productos fitosanitarios, bien ventilados y a temperatura ambiente. Evite que el producto se congele.

• Permitir que intervengan sólo personas adultas y con experiencia en el manejo del producto.

• En la preparación de las diluciones evitar el contacto de la solución con el cuerpo. Emplear máscara protectora, ropa de agua, guantes y botas.

Primeros Auxilios:

• **Contacto Ocular:** enjuagar bien los ojos con abundante agua corriente durante 15 minutos. No administrar medicamentos. Si se provocara una irritación persistente, consultar a un médico.

• **Contacto con la piel:** retirar la vestimenta y lavar la zona afectada durante algunos minutos con abundante agua corriente y jabón neutro. Si se llegase a desarrollar una irritación persistente, consultar a un médico.

• **Ingestión:** En caso de ingestión no inducir vómitos, avisar y mostrar la etiqueta a un médico.

• **Caso de Inhalación:** Salir al aire libre. Mantener al afectado abrigado y en descanso. Llamar a un médico.

Teléfonos de Emergencia: Rita - Chile 22 661 9414 / 22 777 1994 ó SummitAgro Chile 22 430 6300

Nota al Comprador: A nuestro entender la información contenida en esta etiqueta es correcta, y garantizamos la composición, formulación y contenido activo de este producto. Sin embargo, como en la aplicación del producto intervienen numerosos aspectos que escapan a nuestro control (tales como la preparación de mezcla, aplicación del producto y climatología, entre otros), el usuario será responsable de los daños (tales como falta de eficacia, toxicidad en general y residuos, entre otros) causados por la inobservancia total o parcial de las indicaciones de uso de esta etiqueta o por el almacenamiento inadecuado del producto.