

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo químico: ROMEO es un inductor de resistencia sistémica, en base a Cerevisana (Paredes celulares de levadura de *Saccharomyces cerevisiae*, cepa LAS117).

Durante la preparación: utilizar equipo de protección individual: guantes impermeables, botas de goma, delantal impermeable, gafas con protección lateral y mascarilla con filtro.
Durante la aplicación: utilizar: guantes impermeables, botas de goma, overol impermeable, gafas con protección lateral y mascarilla con filtro. No coma, beba ni fume durante la preparación y aplicación del producto. Al terminar la aplicación y antes de comer, beber o fumar, lavarse las manos y partes del cuerpo que hayan tenido contacto con la mezcla y lavar perfectamente la ropa que se usó durante la aplicación. No contaminar fuentes o cursos de agua.

Información Ecotoxicológica: ROMEO no es tóxico a organismos acuáticos (peces, microcrustáceos y algas), aves ni abejas. No verter o eliminar el producto o sus envases en fuentes o cursos de agua.

<<MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS>>
<<NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS U OTRAS FUENTES DE AGUA>>
<<NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO>>
<<EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD>>
<<INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES>>
<<LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE>>
<<NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL>>

Síntomas de Intoxicación: No se conocen síntomas o efectos específicos de intoxicación, agudos o retardados. En caso de exposición aguda oral se pueden presentar síntomas inespecíficos como mareos, náuseas y malestar general.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de inhalación: Traslade al paciente a un lugar ventilado y manténgalo en reposo. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Llevar a un centro asistencial de inmediato.

En caso de contacto con la piel: Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volverla a usar. Si la irritación persiste contacte un médico.

En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, además los lentes no deberán utilizarse nuevamente. Si la irritación persiste contacte un médico.

En caso de ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente al centro asistencial.

Tratamiento Médico de Emergencia: Realizar tratamiento sintomático.

Antídoto: No específico.

Teléfonos de Emergencia:

CITUC CHILE (+56 2) 22635 3800 Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile, atención las 24 hrs.

Almacenar en lugares frescos, temperaturas ideales de 10 a 25°C. Mantener fuera de la luz directa del sol. Cuando el contenedor se abra, asegúrese de usar todo el contenido para mejores resultados. Manténgase en su envase original bien etiquetado y cerrado y lejos de plaguicidas, semillas y forraje.

ROMEO

INDUCTOR DE RESISTENCIA SISTÉMICA POLVO MOJABLE (WP)

ROMEO actúa como un inductor de resistencia sistémica y posee un efecto elicitor para la prevención y control de enfermedades fúngicas indicado en el Cuadro de Instrucciones de Uso.

Composición

Cerevisana.....95,5% p/p (955 g/kg)
Coformulantes c.s.p.....100 g (1 kg)

AUTORIZACIÓN SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO N° 4.265

NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO

Lote No.:
Fecha de Fabricación:
Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto:

<<LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO>>

Fabricado por:

Biospringer.
103 Rue Jean Jaurès, 94700 Maisons Alfort,
Francia

Para:

Agrauxine
137 rue Gabriel Péri, 59700 Marcq en Baroeul
Francia

Importado por:

Lesaffre Industrial Chile S.A.
Las Esteras Norte 2751 – Quilicura –Santiago
Chile
Fono: +56 2 2623 6185

Distribuido por:

Summit Agro Chile SpA.
Orinoco 90 Oficina 2002 – Las Condes – Santiago
Chile



INSTRUCCIONES DE USO

ROMEO actúa como un inductor de resistencia sistémica y posee un efecto elicitor para la prevención y control de enfermedades fúngicas. ROMEO genera mecanismos de defensa en la propia planta de manera sistémica consiguiendo que se retrase el ataque de los patógenos y que éstos sean menos virulentos. La sustancia activa (Cerevisane) estimula los mecanismos de defensa de las plantas para que estas mismas puedan protegerse contra la infección por distintas especies de hongos. Evite la aplicación a altas temperaturas. En caso de fuertes lluvias en las horas después de la aplicación, repita el tratamiento del producto de nuevo.

Cuadro de Instrucciones de Uso

Cultivo	Enfermedad	Dosis (gr/ha)	Observaciones
Vid de mesa, vinífera y pisquera	Oídio (<i>Erysiphe necator</i>)	250 – 500	Aplicar desde brotación a pinta vía aspersión foliar, con un máximo de cinco aplicaciones por temporada para control preventivo de la enfermedad. Se sugiere respetar un máximo de 7 – 10 días entre aplicaciones. Emplear volumen de agua variable entre 500 – 1500 L/ha (dependiendo del equipo de aplicación), utilizando la dosis mayor a mayor presión de la enfermedad.
Vid de mesa, vinífera y pisquera	Pudrición Gris del Racimo (<i>Botrytis cinerea</i>)	250 – 500	Aplicar desde inicio de botón floral a precosecha vía aspersión foliar. Se sugiere respetar un máximo de 7 – 10 días entre aplicaciones. Emplear volumen de agua variable entre 500 – 1500 L/ha (dependiendo del equipo de aplicación), utilizando la dosis mayor a mayor presión de la enfermedad. Cantidad de aplicaciones por temporada para control preventivo de la enfermedad: -Vid de mesa: Máximo cinco aplicaciones. -Vid vinífera: Máximo cuatro aplicaciones.
Arándanos	Pudrición Gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	250 – 500	Aplicar desde el período de inicio de flor a precosecha vía aspersión foliar, con un máximo de cuatro aplicaciones por temporada para control preventivo de la enfermedad. Se sugiere respetar un máximo de 7 – 10 días entre aplicaciones. Emplear volumen de agua variable entre 500 – 1000 L/ha (dependiendo del equipo de aplicación), utilizando la dosis mayor a mayor presión de la enfermedad.
Cerezos	Pudrición negra (<i>Alternaria alternata</i>) Pudrición Gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	250	Aplicar desde crecimiento de fruto en adelante hasta cosecha vía aspersión foliar. Se recomienda realizar un máximo de 3 aplicaciones por temporada para control preventivo de la enfermedad y alternar las aplicaciones con productos de diferente modo de acción. Emplear con volumen de agua variable entre 1000 – 1200 L/ha (dependiendo del equipo de aplicación) y un intervalo no superior a 7 días, utilizando la dosis mayor a mayor presión de la enfermedad.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Llenar el estanque del equipo aplicador con agua hasta la mitad y agregar la cantidad recomendada de ROMEO, luego completar con agua hasta el nivel requerido manteniendo siempre el sistema agitador funcionando de manera de aplicar una mezcla homogénea.

COMPATIBILIDAD: Antes de realizar cualquier tipo de mezclas, se recomienda realizar pruebas previas de compatibilidad.

INCOMPATIBILIDAD: Evite todo contacto con agentes muy oxidantes. En caso de dudas, realizar pruebas de compatibilidad antes de mezclar en el equipo aplicador.

FITOTOXICIDAD: ROMEO no es fitotóxico en el cultivo indicado cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso.

TIEMPO DE REINGRESO: Tanto para personas y animales se sugiere esperar hasta que se seque el depósito aplicado, reingresando 4 horas después de la aplicación.

PERIODO DE CARENANCIA: Por la naturaleza del producto está exento de tolerancia, por lo tanto, no corresponde un período de carencia.

Nota al Comprador: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.



CUIDADO

