

PANZER® GOLD

HERBICIDA

INFORMACIÓN GENERAL			
INGREDIENTE ACTIVO	Glifosato-dimetilamonio		
GRUPO QUÍMICO	organofosfonatos.		
CONCENTRACIÓN	Glifosato-dimetilamonio 60,8 % p/v (608 g/L) (48 % p/v (480 g/L) de equivalente ácido de glifosato)		
FORMULACIÓN	Concentrado Soluble (SL)		
MODO DE ACCIÓN	Sistémico.		
FABRICANTE /FORMULADOR	Corteva Agriscience Argentina S.R.L. Hipólito Irigoyen 2900, Puerto General San Martín, Provincia de Santa Fe, Argentina. ATANOR S.C.A. Dr. Román Subiza 1150, San Nicolás, Provincia de Buenos Aires, Argentina. ATANOR S.C.A. Calle 3 y 8 - (1629). Parque Industrial Pilar, Provincia de Buenos Aires, Argentina.		
DISTRIBUIDOR EN CHILE	Summit Agro® Chile SpA.		
TOXICIDAD	Grupo IV. Producto que normalmente no ofrece peligro		
ANTIDOTO	No se conoce antídoto específico.		
AUTORIZACIÓN SAG Nº	3.536		
PRINCIPALES CARACTERISTICAS			
PANZER® GOLD es un herbicida sistémico de aplicación postemergencia, para el control total de malezas, anuales, bienales y perennes, en plantaciones forestales, huertos frutales, parronales y viñas, así como en cero labranza y regeneración de praderas, según lo indicado en las instrucciones de uso de esta etiqueta.			
INSTRUCCIONES DE USO			
Cuadro de Instrucciones de Uso para aplicaciones terrestres:			
Cultivo	Malezas	Dosis L/ha	Observaciones
Almendros, arándanos, avellano europeo, cerezos, ciruelos, clementinas, damascos, durazneros, frambuesas, kiwis, limones, mandarinos, manzanos, naranjos, nectarines, nogales, olivos, paltos, perales, pomelos, tangerinas y vides.	Gramíneas anuales, ballicas, vulpia, hualcacho.	1 – 1,5	Aplicar dirigido sólo al follaje de las malezas. Evitar el contacto de Panzer® Gold con cualquier parte verde de los cultivos, incluyendo el tronco en árboles jóvenes, cuya corteza no esté completamente lignificada.
	Hoja ancha anuales, yuyo, bledo, manzanilla, sanguinaria.	1,5 – 3	
	Maicillo, pasto cebolla, chépica gigante, falso té, correhuela, vinagrillo.	2,2 - 3	Aplicar sobre malezas en crecimiento activo usando agua limpia, sin barro, que puede disminuir la efectividad del tratamiento. Usar dosis altas en situaciones de alta densidad. Máximo 5 aplicaciones por temporada con al menos 45 días entre cada una de ellas.
	Pasto bermuda, chufa.	4,5 - 6	
Pinos, eucaliptos, álamos.	Avenilla, chépica, correhuela, diente de león, hierba azul, hierba del chanco, margarita, pasto cebolla, rábano, vinagrillo, yuyo.	1,5 – 3	Aplicar de preplantación y/o en postplantación, evitando todo contacto o deriva sobre la plantación. Máximo 5 aplicaciones por temporada con al menos 45 días entre cada una de ellas.
	Aromos, quila, retamilla, retamo, maqui, ulex.	3 – 4,5	
Barbecho químico, Regeneración de praderas.	Avenilla, chépica, correhuela, diente de león, hierba azul, hierba del chanco, margarita, pasto cebolla, rábano, vinagrillo, yuyo.	1,5 - 3	Esperar tres a siete días antes de mover el suelo, para permitir una completa translocación del producto

Cuadro de Instrucciones de Uso para aplicaciones aéreas:

Cultivos	Malezas	Dosis L/ha	Observaciones
Pinos, eucaliptos, álamos	Avenilla, chépica, correhuela, diente de león, hierba azul, hierba del chancho, margarita, pasto cebolla, rábano, vinagrillo, yuyo	1,5 – 3	Aplicar de preplantación y/o en postplantación, evitando todo contacto o deriva sobre la plantación. Utilizar mojado de 30 – 60 L agua/ha.
	Aromos, quila, retamilla, retamo, maqui, ulex.	3 – 4,5	

“PARA APLICACIONES AÉREAS PROHÍBESE TODA APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS CUANDO LA VELOCIDAD DEL VIENTO SUPERE LOS 15 KM/HORA.”

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Llene el estanque hasta la mitad, haga una premezcla con la cantidad de **PANZER® GOLD** necesaria, y agitando complete el volumen de agua necesario. (100 – 200 L/ha).

COMPATIBILIDAD:

En barbechos químicos, **PANZER® GOLD** puede mezclarse con Starane® Xtra o Esterón® Ten Ten. También es compatible con atrazina, MCPA, Garlon® y Tordon® entre otros herbicidas. **PANZER® GOLD** puede ser mezclado con Goal® 2EC para malezas de difícil control. Al realizar una mezcla no conocida, se recomienda efectuar una confirmación previa de compatibilidad y miscibilidad o consultar a nuestro Departamento Técnico.

INCOMPATIBILIDAD

No mezclar con herbicidas de contacto. Aguas sucias con suelo en suspensión o materia orgánica pueden disminuir su eficacia.

FITOTOXICIDAD

Debe tomarse todas las precauciones para evitar deriva a cultivos cercanos para evitar daños a estos. Evite aplicar con viento.

PERÍODO DE CARENIA (DÍAS)

No corresponde.

TIEMPO DE REINGRESO

Esperar 4 horas después de realizada la aplicación, para reingresar personas o animales al área tratada.

OTRAS INFORMACIONES: Máximo 5 aplicaciones por temporada con al menos 45 días entre cada una de ellas.

Durante la aplicación del producto, se recuerda tener en consideración las regulaciones relativas a la protección de especies nativas establecidas por la normativa nacional. En la naturaleza existe la posibilidad de ocurrencia de biotipos resistentes a herbicidas, esto puede ocurrir a **PANZER® GOLD** como a otros herbicidas de su mismo grupo químico, a través de una mutación normal en cualquier población de malezas. En estos casos el uso repetido de este grupo de herbicidas puede llevar a estos biotipos de malezas a ser dominantes por lo que la población de malezas será de difícil control. La ocurrencia de poblaciones resistentes es difícil de detectar antes de la aplicación de **PANZER® GOLD**, por lo que tanto el fabricante, importador y distribuidor no pueden aceptar responsabilidad alguna por pérdidas sufridas debido a la falta de control de estas malezas resistentes. En caso de duda, consultar a nuestro Departamento Técnico.

Advertencia: Aunque las informaciones y recomendaciones contenidas aquí están expuestas con el mejor de nuestros conocimientos y son consideradas correctas hasta la fecha del presente documento, no aceptaremos reclamaciones en cuanto a la exhaustividad o exactitud de las mismas. Este tipo de informaciones y recomendaciones no exoneran a las personas que reciban las mismas de tomar sus propias decisiones que sean convenientes para su preferente aplicación práctica. Ningún reclamo o exigencia de garantía ya sea expresa o implícita de cualquier tipo o naturaleza, podrá hacerse en relación con las informaciones o recomendaciones del producto al cual estas se refieren. El fabricante garantiza la óptima calidad del producto y su efectividad, cuando se utiliza de acuerdo con su recomendación. Sin embargo, éste no se responsabiliza por fallas, daños y perjuicios que pudiera ocasionar su uso inadecuado ya sea por mal manejo del almacenamiento y/o mala manipulación de los envases y/o trasvasijos.

El fabricante garantiza la calidad y contenido del ingrediente activo señalado en esta etiqueta hasta que el producto salga de su control directo. Debido a que la acción de un plaguicida puede resultar influenciada por diversos factores, no se asume responsabilidad alguna por eventuales daños de cualquier naturaleza, derivadas de su uso, manipulación o almacenaje.

LEA SIEMPRE LA ETIQUETA DEL PRODUCTO ANTES DE LA APLICACIÓN DEL MISMO.

Ficha Técnica
válida para Chile