

SENCOR® 480 SC

HERBICIDA

INFORMACIÓN GENERAL		
INGREDIENTE ACTIVO	Metribuzina	
CONCENTRACIÓN	48% p/v (480 g/L)	
GRUPO QUÍMICO	1,2,4-triazinonas	
FORMULACIÓN	Suspensión concentrada (SC)	
MODO DE ACCIÓN	Acción sistémica selectiva	
FABRICANTE /FORMULADOR	- Agro Bayer S.R.L. Camino de la Costa Brava s/n, Zárate Industrial Park, 2800 Zárate, Argentina - Bayer CropScience S.A : Estrada da Boa Esperança, 650 - CEP: 26110-100 - Belford Roxo/RJ, Belford Roxo, Brasil - Bayer A.G: Industriepark Hoechst, 65926 Frankfurt, Alemania	
DISTRIBUIDOR EN CHILE	SUMMITAGRO® CHILE SpA.	
TOXICIDAD	Grupo II Moderadamente peligroso	
ANTIDOTO	No tiene	
AUTORIZACIÓN SAG N°	3238	
CLASIFICACION ECOTOXICOLOGICA ABEJAS (Res. 7068/2024)	Ligeramente toxico. No requiere avisaje	
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS		
SENCOR® 480 SC es un herbicida sistémico selectivo, que controla a través de hojas y raíces, malezas de hoja ancha y gramíneas en papas, tomates, espárragos y lupino, de acuerdo con la información presente en el cuadro de instrucciones de uso.		
INSTRUCCIONES DE USO		
Herbicida sistémico selectivo que controla a través de hojas y raíces, malezas de hoja ancha como Rábano Yuyo, Chamico, Quingüilla, Verdolaga y malezas gramíneas como Pata de gallina, Hualcacho, Piojillo, Ballica en Tomates, Papas, Espárragos y también en cultivos de Lupino.		
CUADRO INSTRUCCIONES DE USO:		
Cultivos	Dosis (L/ha)	Observaciones
Papa (Zona Norte y Centro)	0,6 – 0,7 L/ha	Aplicar desde postemergencia con plantas de hasta 10 a 15 cm de altura y malezas comenzando a emerger. Se puede aplicar también en preemergencia, aporcando previamente. Realizar una aplicación por temporada
Papa (Zona Sur)	1,1 – 1,5 L/ha	Aplicar desde que se insinúe la emergencia hasta que las plantitas tengan 10 cm de altura. Realizar una aplicación por temporada.

Tomates (Pretrasplante)	1 – 1,4 L/ha	Aplicación Pretrasplante, incorporando al suelo con el último rastraje o con el riego. Realizar una aplicación por temporada.
Tomates (Postrasplante)	0,6 – 1,0 L/ha	En plantaciones a raíz desnuda, aplicar 20 – 25 días después del trasplante. En plantaciones con plantas provenientes de speedling, aplicar 15 a 20 días después del trasplante. En ambos casos con plantitas bien arraigadas, y malezas comenzando a emerger o hasta primer par de hojas verdaderas. Realizar una aplicación por temporada.
Espárragos (en producción)	1,4 – 2 L/ha	En espárrago blanco con camellones aporcados, antes de la emergencia de los turiones. En espárrago verde sobre suelo bien mullido antes de emergencia de turiones. Realizar una aplicación por temporada.
Lupino	1 – 1,5 L/ha	Aplicar de preemergencia del cultivo, inmediatamente después de la siembra, con buena humedad de suelo. Utilizar un mojamiento de 150 a 200 L de agua/ha. Realizar una aplicación por temporada.

Bajo ciertas condiciones naturales existe la posibilidad de ocurrencia de biotipos resistentes a herbicidas, lo que puede ocurrir también con el herbicida **SENCOR® 480 SC**, como con otros productos, a través de una variación genética normal en cualquier población de malezas. Estos biotipos resistentes pueden llegar a ser dominantes después del uso repetido de un grupo de herbicidas y la población llegará a ser de difícil control con este tipo de productos. La ocurrencia de poblaciones resistentes es difícil de detectar antes de la aplicación del herbicida **SENCOR® 480 SC**, por lo que **SUMMITAGRO CHILE** no puede aceptar responsabilidades algunas por pérdidas sufridas debido a la falta de control de estas malezas resistentes.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Agregar al estanque con poca agua la cantidad necesaria de **SENCOR® 480 SC**. Luego llenar el estanque de la bomba con agua bajo agitación continua.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico al ser aplicado de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta y siguiendo las buenas prácticas agrícolas. En variedades de papas de piel blanca, aplicar sólo en preemergencia. En tomates: No aplicar en cultivos bajo plástico, no aplicar en suelos arenosos, no aplicar en periodos de hasta 3 días de tiempo frío, húmedo o nublado, de lo contrario podrían ocurrir pequeños daños por fitotoxicidad.

PERÍODO DE CARENCIA (DÍAS)

Papas, Tomates, Lupino : 60 días.
Espárragos: 14 días.

TIEMPO DE REINGRESO

No reingresar al área tratada antes transcurridas 2 horas después de la aplicación, verificando que la aspersión se haya secado sobre la superficie tratada. Para animales, no corresponde indicar un tiempo de reingreso, ya que los cultivos indicados no se destinan a uso animal en pastoreo.

COMPATIBILIDAD
En caso de dudas respecto de la compatibilidad con otros productos, consultar al Departamento Técnico antes de realizar la mezcla.
INCOMPATIBILIDAD
No aplicar junto ni en aplicaciones consecutivas separadas con productos en reacción alcalina. Normalmente se emplea solo.
OTRAS INFORMACIONES
Usar de preferencia bomba manual de espalda o equipo provisto de barra pulverizadora, con un gasto de 150 a 200 L de agua/ha en aplicaciones de preemergencia de malezas y 200 a 400 L de agua/ha en aplicaciones de postemergencia de malezas. Aplicar en suelo húmedo. Utilizar dosis más bajas en suelos livianos y de bajo contenido de materia orgánica. La persistencia y acción de este producto depende principalmente de las condiciones atmosféricas y del tipo de suelo. Efectuar labor profunda si el suelo se cultiva antes de 6 meses de realizada la aplicación. Si no tiene experiencia con este producto en el predio, aplique sólo en un sector representativo. Su uso requiere asesoría de especialista para cada caso.

Advertencia: Aunque las informaciones y recomendaciones contenidas aquí están expuestas con el mejor de nuestros conocimientos y son consideradas correctas hasta la fecha del presente documento, no aceptaremos reclamaciones en cuanto a la exhaustividad o exactitud de estas. Este tipo de informaciones y recomendaciones no exoneran a las personas que reciban las mismas de tomar sus propias decisiones que sean convenientes para su preferente aplicación práctica. Ningún reclamo o exigencia de garantía ya sea expresa o implícita de cualquier tipo o naturaleza, podrá hacerse en relación con las informaciones o recomendaciones del producto al cual estas se refieren. **LEA SIEMPRE LA ETIQUETA DEL PRODUCTO ANTES DE LA APLICACIÓN DEL MISMO.**

Ficha Técnica
válida para Chile