

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar la aspersión.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Almacenar en un lugar fresco, con buena ventilación, lejos de la casa - habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo Químico: Diacilhidrazina**
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos por 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Si el paciente está consciente no dar nada por vía oral.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Nota al médico: no existe un antídoto específico. Administrar tratamiento sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106 / SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA.,
SUCURSAL PERU: 444-3096 / CICOTOX: (511) 619-7000 IP 4836 - 4837, Línea
directa: 956740869

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores aledaños días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

Mimic®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada - (SC)

COMPOSICIÓN

Tebufenozide 240 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

PQUA N° 2096 - SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:

SummitAgro

SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA., SUCURSAL PERU

Calle Coronel Andrés Reyes N° 360 Of. 401-A

San Isidro. Lima - Perú

Tel.: (511) 444-3096

Formulado por:

SUMMIT AGRO COLOMBIA S.A.S.

Calle 113, N° 7-21, Oficina 111, Edificio Teleport Business Park, Torre A,
Bogotá DC - Colombia

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido neto : **1 Litro**
Fecha de vencimiento :
® **Marca Registrada**

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

MIMIC® se recomienda específicamente para el control de larvas de lepidópteros. La larva tratada deja de alimentarse antes de 24 horas, no puede deshacerse de su vieja muda y muere por deshidratación e inanición después de 48 a 72 horas.

MIMIC® se aplica en pulverización empleando tanto equipos terrestres como aéreos. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Finalmente complete hasta el volumen deseado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS			P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	%	L/Ha	L/200L		
Algodón	"Gusano perforador grande de la bellota"	<i>Heliothis virescens</i>	0.2	0.80	-	30	1.5
Espárrago	"Gusano cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.15	0.60	-	7	0.5
	"Comedor de follaje"	<i>Copitarsia decolora</i>	0.05	0.30	-		
Coliflor	"Gusano medidor de la hoja"	<i>Chrysodeixis (=Pseudoplusia) includens</i>	0.10	0.50	-	7	0.5
	"Poquilla del dorso de diamante"	<i>Plutella xylostella</i>	0.15	0.75	-		
Palto	"Gusano del cesto"	<i>Oiketicus kirbyi</i>	-	0.40	-	21	1
Maíz	"Gusano cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	-	-	0.4-0.5	42	0.01
Pimienta	"Gusano perforador grande de la bellota"	<i>Heliothis virescens</i>	0.10	0.50	-	7	1
Tomate	"Oruga minadora de hoja y tallo"	<i>Tuta (=Scrobipalpa) absoluta</i>	0.2	0.80	-	7	0.5
Aroz	"Gusano cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	-	-	0.50	21	3
Arandano	"Gusano perforador grande de la bellota"	<i>Heliothis virescens</i>	-	-	0.4-0.5	14	3

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)

P.C.: Periodo de carencia (días)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar MIMIC® (i.a. tebufenozide) una aplicación por campaña como máximo. El periodo residual del producto es de aproximadamente 14 a 21 días. Aplicar de preferencia antes de la eclosión de los huevos para optimizar la actividad. Aplicar al observar posturas o en ataques iniciales a los botones florales o frutos.

Para el caso de maíz, aplicar de 15 a 20 días después de la siembra, considerando 2 aplicaciones por campaña y una campaña al año.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingresar al área hasta después de 24 horas de aplicar el producto.

COMPATIBILIDAD

MIMIC® es compatible con la mayoría de plaguicidas normalmente empleados.

FITOTOXICIDAD

El producto no produce fitotoxicidad sobre los cultivos recomendados utilizándose de acuerdo a las instrucciones dadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

