

## IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Ingrediente Activo	<i>Hypocrea virens</i> cepa Ñire, <i>Trichoderma gamsii</i> cepa Volqui y <i>Bionectria ochroleuca</i> cepa Mitique.
No. CAS	No aplica
Nombre Químico	No aplica
Concentración	<i>Hypocrea virens</i> cepa Ñire, 0,33% p/p (3,3 g/kg) <i>Trichoderma gamsii</i> cepa Volqui 0,33% p/p (3,3 g/kg) <i>Bionectria ochroleuca</i> cepa Mitique. 0,33% p/p (3,3 g/kg)
Formulación	Polvo mojable
Tipo de Producto	Bioestimulante
Categoría Toxicológica	No aplicable
No. Registro	No aplicable

## PROPIEDADES FISICAS – QUIMICAS

Apariencia	Polvo mojable color beige con olor característico
pH	6.9
Densidad	0.54 g/ml
Estabilidad de Almacenamiento	Almacenar en lugares frescos, secos y bien ventilados en envases originales, herméticamente cerrados y lejos del alcance de los niños. Tiempo máximo de almacenamiento de 12 meses.
Propiedades Corrosivas	No corrosivo
Propiedades Inflamables	No inflamable
Propiedades explosivas	No explosivo

## BIOQUIMICA

Modo y Mecanismo de Acción	<b>MAMULL® WP</b> es un excelente bioestimulante del crecimiento vegetativo, formulado como polvo mojable (WP), favorece el crecimiento vegetativo y estimula la brotación. Formulado en base a cepas nativas de microorganismos colonizadores de tejidos vegetales y un acarreador orgánico. Coloniza e impide el ingreso de microorganismos como hongos y bacterias. Posee características de estimulante biológico en los cultivos recomendados, con amplia aplicabilidad en frutales y hortalizas.
----------------------------	--

## COMERCIALIZACION

Presentaciones Comerciales	Bolsas por 1 Kg y 5 Kg.
Formulador	Bio Insumos Nativa SpA.
Importador	Bio Insumos Nativa Perú SAC.
Distribuidor	Summit Agro South America SpA., Sucursal Perú

**APLICACIÓN DEL PRODUCTO**

Modo de Aplicación	Aplicación foliar.
Frecuencia y Época de Aplicación	Las dosis de aplicación deberán ajustarse según el tamaño de las plantas. Usar suficiente agua para una buena cobertura.
Recomendaciones de Aplicación	Agitar bien el producto antes de abrirlo y luego dejar decantando por un minuto antes de aplicación o riego. La preparación debe aplicarse máximo 4 horas después de preparada y mantenida en agitación.
Compatibilidad	No mezclar MAMULL® con plaguicidas y agroquímicos sin realizar antes una prueba de compatibilidad o por instrucción del fabricante. Consultar lista de compatibilidad con el fabricante.

**CUADRO DE USO**

CULTIVO	DOSIS (g /200L)	OBSERVACIONES
Manzano Pera	200	Manejo de hojarasca. Asperjar con MAMULL®, directamente sobre los cortes o heridas. Aplicar inmediatamente después de efectuada la labor, cubriendo por completo. Mínimo una aplicación por corte o herida por temporada. No aplicar con lluvias.
Tomate		Asperjar con MAMULL®, directamente sobre los cortes o heridas. Aplicar inmediatamente después de efectuada la labor, cubriendo por completo. Mínimo una aplicación por corte o herida por temporada.
Vid		Asperjar con MAMULL®, directamente sobre los cortes o heridas. Aplicar inmediatamente después de efectuada la labor, cubriendo por completo. Mínimo una aplicación por corte o herida por temporada. No aplicar con lluvias.
Cerezo Ciruelo Durazno Nectarines		Asperjar con MAMULL®, directamente sobre los cortes o heridas. Aplicar inmediatamente después de efectuada la labor, cubriendo por completo. Mínimo una aplicación por corte o herida por temporada. No aplicar con lluvias.
Arándano Frambuesa		Asperjar con MAMULL®, directamente sobre los cortes o heridas. Aplicar inmediatamente después de efectuada la labor, cubriendo por completo. Mínimo una aplicación por corte o herida por temporada. No aplicar con lluvias.
Nogales Avellano Almendro		Asperjar con MAMULL®, directamente sobre los cortes o heridas. Aplicar inmediatamente después de efectuada la labor, cubriendo por completo. Mínimo una aplicación por corte o herida por temporada. No aplicar con lluvias.
Kiwi		Asperjar con MAMULL®, directamente sobre los cortes o heridas. Aplicar inmediatamente después de efectuada la labor, cubriendo por completo. Mínimo una aplicación por corte o herida por temporada. No aplicar con lluvias.
Cítricos		Asperjar con MAMULL®, directamente sobre los cortes o heridas. Aplicar inmediatamente después de efectuada la labor, cubriendo por completo. Mínimo una aplicación por corte o herida por temporada. No aplicar con lluvias.

---

Palto	Asperjar con MAMULL®, directamente sobre los cortes o heridas Aplicar inmediatamente después de efectuada la labor, cubriendo por completo. Mínimo una aplicación por corte o herida por temporada. No aplicar con lluvias.
-------	---