

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- "No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación".
- "Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado".
- "Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón".
- "Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas".
- Manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños y de las personas inexpertas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Evitar su ingestión o inhalación, no comer, beber, o fumar durante la preparación y aplicación, utilizar guantes, botas y delantal adecuados para la aplicación del producto.

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

##### Grupo Químico: POLISACARIDO

- "En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta".
- "En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón".
- En caso de inhalación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente donde el médico y muéstrele la etiqueta.
- Si se ingiere una alta cantidad, beber inmediatamente un (1) litros de agua o más.
- Nota al médico: no tiene antídoto específico. Seguir tratamiento sintomático.

#### TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106

SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA, SUCURSAL PERU: (511) 444-3096  
CICOTOX: (511) 619-7000 IP 4836-4837, Línea directa: 956740869

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No lavar los envases o equipos de aplicación en lagos, ríos y otras fuentes de agua.
- **BIOREND®** no es riesgoso para aves, peces y fauna silvestre general.



PLAGUICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

Concentrado Soluble - SL

#### Composición:

Quitosano: poly-D-glucosamina..... 25 g/L  
Aditivos..... c.s.p. 1 L

Reg. PBUA N° 088 - SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuido por:



SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA., SUCURSAL PERU  
Calle Coronel Andrés Reyes 360 Of. 401-A San Isidro, Lima - Perú  
Telf.: (511) 444-3096

Formulado por:  
BIOTEX S.A.

María Auxiliadora 721, Santiago - Chile Teléfono (56-2) 512-4007

Fecha de Formulación :  
N° de Lote :  
Contenido neto : 1 Litro  
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**BIOREND®** es un fitoregulador - bioestimulante agrícola que fortalece la presencia de quitina en la pared celular de las plantas cultivadas, permitiendo una mayor y mejor protección de raíces, ya que impide la penetración de hongos y bacterias al interior de las heridas o daños de raíces, que siempre ocurren al momento del trasplante, reduciendo además la deshidratación post-trasplante, aumentando el desarrollo radicular y confiriendo mayor resistencia a los daños causados por heladas y sequías.

Tratamiento de semillas, tratar las semillas previamente a la siembra de forma que el cubrimiento sea uniforme. Baño de raíces, se recomienda previo al trasplante sumergir las raíces por 15 a 20 segundos en solución de 1 lt. de **BIOREND®** en 9 lt. de agua.

Tratamiento en Viveros, aplicar al sustrato con bomba de espalda provista de dosificador u otro equipo similar a razón de 10 ml. de solución al 5% por planta.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	USO	DOSIS L/ha	APLICACIÓN	P.C. días	L.M.R. (ppm)
Páprika	Fitoregulador	7.00	Disuelto en agua de riego	0	*
Vid	Fitoregulador	15 - 20	Disuelto en agua de riego	0	*
Arándano	Fitoregulador	15	Vía drench	0	*
Palto	Fitoregulador	15 - 20	Vía drench	0	*

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)

P.C.: Periodo de Carencia (días)

\*: Exento de LMR

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicación vía riego tecnificado, aplicar 2 a 3 veces durante la temporada, la primera vez a los 45 días de la siembra. En el caso de cultivos anuales y la segunda con días de diferencia. En el caso de frutales o vides 2 a 3 veces durante la temporada, parcializando cada 30 días. Se debe aplicar una solución al 1% de cada riego.

#### PERIODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas hasta 12 horas de la aplicación.

#### COMPATIBILIDAD

En el tratamiento de semillas de **BIOREND®** no debe ser mezclado con otro agroquímico, si se usa otro tratamiento de semilla, debe ser aplicado antes de **BIOREND®** en cuyo caso la película de **BIOREND®** le servirá como sellante. En las disoluciones para viveros, baño de raíces o riego tecnificado se debe utilizar aguas con pH superior a 6.5, pues causa la precipitación del ingrediente activo. En el tratamiento de semillas se debe sembrar con semillas totalmente secas, en el baño de raíces una vez que el sistema radicular ha sido sumergido en la solución de **BIOREND®** la plantación debe efectuarse de inmediato.

#### FITOTOXICIDAD

**BIOREND®** no es fitotóxico en la dosis de aplicación y cultivos recomendados.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



PRECAUCIÓN

