

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
 “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar la aspersión.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Almacenar en un lugar fresco, con buena ventilación, lejos de la casa - habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Diacilhidrazina
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos por 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Si el paciente está consciente no dar nada por vía oral.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Nota al médico: no existe un antídoto específico. Administrar tratamiento sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106
SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA, SUCURSAL PERU: (511) 444-3096
CICOTOX: (511) 619-7000 IP 4836-4837, Línea directa: 956740869

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores aledaños días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

Mimic®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada - (SC)

COMPOSICIÓN

Tebufenozide 240 g/L
 Aditivos 6 S.p. 1 L

PQUA N° 2096 - SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuido por:



SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA., SUCURSAL PERU

Calle Coronel Andrés Reyes N° 360 Of. 401-A
 San Isidro, Lima - Perú
 Telf.: (511) 444-3096

Formulado por:

SUMMIT AGRO COLOMBIA S.A.S.

Calle 113, N° 7-21, Oficina 111, Edificio Teleport Business Park, Torre A,
 Bogotá DC - Colombia

Fecha de Formulación :
 N° de Lote :
 Contenido neto : **1 Litro**
 Fecha de vencimiento :

© **Marca Registrada**

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

MIMIC® se recomienda específicamente para el control de larvas de lepidópteros. La larva tratada deja de alimentarse antes de 24 horas, no puede deshacerse de su vieja muda y muere por deshidratación e inanición después de 48 a 72 horas.

MIMIC® se aplica en pulverización empleando tanto equipos terrestres como aéreos. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Finalmente complete hasta el volumen deseado.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| CULTIVO | PLAGAS | | DOSIS | | | P.C. (días) | L.M.R. (ppm) |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|--|------|---------|----------------|-----------------|
| | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | % | L/Ha | L/200L | | |
| Algodón | "Gusano perforador grande de la bellota" | <i>Heliothis virescens</i> | 0.2 | 0.80 | - | 30 | 1.5 |
| | "Gusano cogollero" | <i>Spodoptera frugiperda</i> | 0.15 | 0.60 | - | 7 | 0.5 |
| Espárrago | "Comedor de follaje" | <i>Copitarsia decolora</i> | 0.05 | 0.30 | - | | |
| | Coliflor | "Gusano medidor de la hoja" | <i>Chrysodeixis (=Pseudeoplusia) includens</i> | 0.10 | 0.50 | - | 7 |
| "Pollilla del dorso de diamante" | | <i>Plutella xylostella</i> | 0.15 | 0.75 | - | | |
| Palto | "Gusano del cesto" | <i>Oiketicus kirbyi</i> | - | 0.40 | - | 21 | 1 |
| Maíz | "Gusano cogollero" | <i>Spodoptera frugiperda</i> | - | - | 0.4-0.5 | 42 | 0.01 |
| Pimiento | "Gusano perforador grande de la bellota" | <i>Heliothis virescens</i> | 0.10 | 0.50 | - | 7 | 1 |
| Tomate | "Oruga minadora de hoja y tallo" | <i>Tuta (=Scrobipalpa) absoluta</i> | 0.2 | 0.80 | - | 7 | 0.5 |
| Arroz | "Gusano cogollero" | <i>Spodoptera frugiperda</i> | - | - | 0.50 | 21 | 3 |
| Arándano | "Gusano perforador grande de la bellota" | <i>Heliothis virescens</i> | - | - | 0.4-0.5 | 14 | 3 |

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)

P.C.: Periodo de carencia (días)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar **MIMIC®** (i.a. tebufenozide) una aplicación por campaña como máximo. El periodo residual del producto es de aproximadamente 14 a 21 días. Aplicar de preferencia antes de la eclosión de los huevos para optimizar la actividad. Aplicar al observar posturas o en ataques iniciales a los botones florales o frutos.

Para el caso de maíz, aplicar de 15 a 20 días después de la siembra, considerando 2 aplicaciones por campaña y una campaña al año.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingresar al área hasta después de 24 horas de aplicar el producto.

COMPATIBILIDAD

MIMIC® es compatible con la mayoría de plaguicidas normalmente empleados.

FITOTOXICIDAD

El producto no produce fitotoxicidad sobre los cultivos recomendados utilizándose de acuerdo a las instrucciones dadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
 CUIDADO**

