“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Agry-Gent Plus® 5000

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

BACTERICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN

Gentamicin Sulfate	.....	100 g/Kg
Oxitetracycline hydrochloride	.....	300 g/Kg
Aditivos	.....	c.s.p. 1 Kg

PQUA N° 2352 - SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:

SUMMIT AGRO

SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA, SUCURSAL PERU
Calle Coronel Andrés Reyes N° 360 Of. 401-A San Isidro, Lima - Perú.
Telf.: (511) 444-3096

Formulado por:
QUÍMICA AGRONÓMICA DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V
Calle 18 N° 20501, Esquina con Innovación,
Parque Industrial Impulso C.P. 31109 Chihuahua, Chih., México.
Telefax (614) 483-9000

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido neto : **800 gr**
Fecha de Vencimiento :

® Marca Registrada

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (aspersión)
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo Químico: Gentamicinas y Tetraciclinas.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, No induzir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, remover ropa contaminada. Lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua manteniendo los parpados abiertos, por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los parpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Avisar al médico inmediatamente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA, SUCURSAL PERU: (511) 444-3096
CICOTOX: (511) 619-7000 IP 4836-4837, Línea directa: 956740869

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
- “Peligroso para organismos acuáticos”.
- “No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos”.
- “No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto”.
- “Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros”.
- “Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada”.
- “El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva”.
- “El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables”.
- “En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas”.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
AGRY GENT PLUS 5000® es un bactericida de uso agrícola que actúa inhibiendo la biosíntesis de proteínas en las bacterias fitopatógenas uniéndose irreversiblemente al ribosoma bacteriano además tiene un efecto sinérgico bacteriostático.

AGRY GENT PLUS 5000® penetra en la planta a través de los estomas y se transporta a través del xilema en forma acropétala a los puntos de crecimiento en donde se establecen y desarrollan las bacterias fitopatógenas.

AGRY GENT PLUS 5000® se aplica en pulverización manual, a motor o equipo tractorizado. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente, complete luego hasta el volumen deseado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
AGRY GENT PLUS 5000® se recomienda máximo 2 aplicaciones por campaña con 14 días de intervalo entre ellas para obtener un control eficaz. En el cultivo de papa, realizar una primera aplicación de **AGRY GENT PLUS 5000®** a los 45 días de la siembra y una segunda aplicación a los 60 de la formación de estolones.

PERIODO DE REINGRESO
No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 12 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

COMPATIBILIDAD
No mezclar con caldo bordelés y cualquier otro producto de fuerte reacción alcalina o extremadamente ácida. Antes de realizar cualquier mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

FITOTOXICIDAD
No presenta síntomas de fitotoxicidad a las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		Dosis (g/cil de 200 L)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Papa	“Pudrición blanda”	*Pectobacterium carotovorum*	160	28	0.01
Arroz	“Añublo bacterial del arroz”	*Burkholderia glumae*	160	28	0.01

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón) **P.C.:** Periodo de Carencia

INFORMACION TECNICA - SUMMIT AGRO