“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Betk-03®

AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

Composición:

*Bacillus thuringiensis** ..... 18.1 g/kg
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

**B. thuringiensis* cepa N1, *B. thuringiensis* cepa N2, *B. thuringiensis* cepa N3, en forma de esporas (en concentración total de 1 x 108 ufc/g, en proporción de mezcla 1:1:1)

Reg. N° 130 – SENASA-PBA-ACBM

SUMMITAGRO

Titular del Registro,
Importado y Distribuido por:
SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA., SUCURSAL PERU
Calle Coronel Andrés Reyes N° 360
Of. 401-A San Isidro. Lima - Perú
Telf.: (511) 444-3096

Formulado por
BIO INSUMOS NATIVA SPA
Parcela Antilhue Lote 4 B2, Maule, Chile
Fono: +56-71-2970696

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido neto : 1kg
Fecha de Vencimiento :

® Marca registrada

NO INFLAMABLE **NO CORROSIVO** **NO EXPLOSIVO**

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO APLICACIÓN
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No utilizar envases vacíos de plaguicidas para almacenar alimentos, ni bebidas.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, NO INDUCIR EL VOMITO. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente. Consulte a un médico.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, traslade al afectado al aire libre. Si no respira, proporcionar respiración artificial. Consulte a un médico.

Antídoto: No tiene antídoto específico, brindar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106 / SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA, SUCURSAL PERU: (511) 444-3096
CICOTOX: (511) 619-7000 IP 4836-4837, Línea directa: 956740869

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de aplicación, sobrantes del producto en envases vacíos.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
- Las cepas de *Bacillus thuringiensis* utilizadas en BETK-03® presentan acción insecticida selectiva a través de la ingestión por parte de las larvas de lepidópteros, logrando un efectivo control.
- La formulación del producto BETK-03® está compuesta por un complejo de esporas/ cristales proteicos los que son reconocidos como las proteínas con acción tóxica sobre los insectos plaga.
- Sistema de preparación y aplicación: Disolver la cantidad necesaria de BETK-03® en un balde con agua, agitando enérgicamente, luego verter en el equipo de aplicación que previamente ha sido llenado hasta la mitad; agitar y terminar de llenar. Mantener con agitación constante. El tiempo máximo para aplicar el producto una vez preparado es de 4 horas.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Para arándano, la aplicación se realiza cuando la planta se encuentra desde brotación a cosecha, como mínimo se realizan 4 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7 días. Para palto, aplicar en crecimiento de fruto, mientras que para espárrago, aplicar en crecimiento vegetativo, en ambos casos se realizan 3 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7 días. En vid realizar las aplicaciones en crecimiento de fruto, se realizarán 6 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7 días.

PERIODO DE REINGRESO
Es posible reingresar 2 horas después de la aplicación o una vez que se ha secado el depósito sobre el follaje, en el caso de seres humanos.

COMPATIBILIDAD
Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso frecuente, excepto con aquellos compuestos cúpricos y antibióticos. No mezclar BETK-03® con insecticidas sin realizar antes una prueba de compatibilidad. Consultar lista de compatibilidad con el fabricante.

FITOTOXICIDAD
No presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/200 L	Kg/Ha		
Arándano	Gusano perforador grande de la bellota	*Chloridea virescens*	0.30 - 0.45	-	N.A.	N.A.
Palto	Gusano medidor	*Sabulodes aegrotata*	0.30 - 0.45	-	N.A.	N.A.
Espárrago	Gusano perforador grande de la bellota	*Heliothis virescens*	0.25 - 0.30	-	N.A.	N.A.
Vid	Caballada (Gusano ejército)	*Spodoptera eridania*	0.25 - 0.30	-	N.A.	N.A.
Pimiento	Gusano perforador grande de la bellota	*Chloridea virescens*	0.25 - 0.30	-	N.A.	N.A.

P.C.: Periodo de carencia **L.M.R.:** Límite máximo de residuos **N.A.:** No Aplica

PRECAUCIÓN

INFORMACIÓN TÉCNICA - SUMMIT AGRO