

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DANINO. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en su envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Strobilurina + Triazole
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestrele una copia de esta etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- El producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA, SUCURSAL PERU: (511) 444-3096 / SAMU: 106 /
CICOTOX: (511) 619-7000 IP 4836-4837, Línea directa: 956740869

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- "Peligroso para los organismos acuáticos".
- "No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos".
- "No contaminar fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto".
- "Respetar una banda de no aplicación hacia un cuerpo de agua de al menos diez (10) metros".
- "Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada".
- "El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas o en suelos altamente permeables".

Race RM®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN

Metominostrobin 150 g/L
Tebuconazole 300 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 2046 - SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:

SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA, SUCURSAL PERU
Calle Coronel Andrés Reyes 360 Of. 401-A San Isidro, Lima - Perú
Telf.: (511) 444-3096

Formulado por:
SUMMIT AGRO ARGENTINA S.A.
Cerrito 1186, Piso 12. Argentina

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido neto : 1 Litro
Fecha de Vencimiento :

® Marca Registrada

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

RACE RM® es un fungicida compuesto por dos principios activos. Metominostrobin y Tebuconazole. RACE RM® presenta una actividad sistémica y de contacto, actúa como protectante y curativo. Puede ser absorbido por el follaje y por la raíz, translocándose en forma acropétala. RACE RM® se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según sea el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar. Aplique con mochila manual o mochila a motor.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO | ENFERMEDAD | | DOSIS | | P.C. (días) | L.M.R. (ppm) |
|---------|--------------------------|---|-------------|-------------|----------------|--|
| | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | L/ 200L | L/Ha | | |
| Arroz | "Pyricularia" | <i>Pyricularia oryzae</i> | 0.15 - 0.20 | 0.15 - 0.20 | 35 | 0.01 ¹⁾ 1.5 ²⁾ |
| | "Sarocladium" | <i>Sarocladium oryzae</i> | 0.30 - 0.35 | 0.30 - 0.35 | | |
| | "Chusquea fungosa" | <i>Rhizoctonia solani</i> | 0.30 - 0.35 | 0.30 - 0.35 | | |
| | "Falso carbón del arroz" | <i>Ustilaginoidea virens</i> | 0.35 | 0.35 | | |
| Manzana | "Oidiosis" | <i>Podosphaera leucotricha</i> | 0.15 - 0.20 | - | 30 | 0.2 ¹⁾ 0.3 ²⁾ |
| Cañola | "Mancha del peral" | <i>Stemphylium vesicarium</i> | 0.15 - 0.20 | - | 35 | 0.01 ¹⁾ 0.15 ²⁾ |
| Durazno | "Oidium" | <i>Sphaerotheca pannosa</i> var. <i>parvicae</i> | 0.15 - 0.20 | 0.60 - 0.80 | 35 | 0.01 ¹⁾ 2 ²⁾ |
| Café | "Roya del caféto" | <i>Hemileia vastatrix</i> | 0.30 - 0.35 | - | 30 | 0.01 ¹⁾ 0.1 ²⁾ |

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)

¹⁾Metominostrobin ²⁾Tebuconazole

P.C.: Período de Carenia (días)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar RACE RM® dos aplicaciones por campaña como máximo considerando dos campañas al año, desde los 15 a 60 días después del trasplante para el control de Pyricularia y 1 aplicación por campaña desde los 80 a 100 días después del trasplante (inicio de espigado) para el control de Sarocladium y de prefloración a floración para el control de Ustilaginoidea. Para durazno aplicar cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad, dosis máxima de aplicación por hectárea es de 0.8 L/Ha, con una sola aplicación por campaña al año. Para café se recomienda dos aplicaciones por campaña considerando una campaña al año, con un intervalo de 14 días durante la etapa de crecimiento vegetativo.

PERIODO DE REINGRESO

Reingresar al campo después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

RACE RM es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina. Antes de realizar la mezcla con otro producto fitosanitario, probar en un envase pequeño si existe o no compatibilidad con el otro pesticida. En caso de existir incompatibilidad, realizar las aspersiones foliares por separado.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a la anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones en instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

