

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# Sanmite®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA - ACARICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

## COMPOSICIÓN

Pyridaben.....200 g/Kg  
Aditivos.....c.s.p 1Kg

Reg. N° 204-96-AG-SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:



**SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA., SUCURSAL PERU**  
Calle Coronel Andrés Reyes 360 Of. 401-A San Isidro, Lima - Perú  
Telf.: (511) 444-3096

Formulado por:  
**NISSAN CHEMICAL CORPORATION**  
5-1, Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 103-6119 Japón.  
Teléfono.: 81 (0)3-4463-8300

Fecha de Formulación :  
N° de Lote :  
Contenido neto : **1 Kg**  
Fecha de Vencimiento :

® Marca Registrada

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

## “LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Consérvese el producto en envases originales, herméticamente cerrados.
- El producto debe ser transportado protegido con un embalaje adecuado y no conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal.
- Debe ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado.
- Evitar que el producto contamine fuentes de agua.
- Durante la mezcla hacer uso de guantes protectores.
- Durante la aplicación hacer uso de guantes, gafas y máscara protectora.
- No coma, beba, ni fume durante la aplicación o manipuleo.
- En caso de haber estado en contacto con el producto, así como después de cada aplicación, se recomienda lavarse bien, así como cambiarse de ropa y lavarla antes de volver a usarla.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta el agua en la mezcla de aplicación. Luego destruya el envase.
- Usar sólo el producto que viene en envases originales.

### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Piridazinona
- En caso de inhalación se recomienda reposo, respirar aire fresco y buscar ayuda médica.
- Tras contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua y jabón.
- Tras contacto con los ojos, lavar inmediata y abundantemente bajo agua corriente durante 15 minutos y con los párpados abiertos.
- En caso de ingestión lavar inmediatamente la boca y beber abundante agua; provocar el vómito.
- Nota al médico; tratamiento sintomático (descontaminar funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

### TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

**SAMU: 106**  
**SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA, SUCURSAL PERU: (511) 444-3096**  
**CICOTOX: (511) 619-7000 IP 4836-4837, Línea directa: 956740869**

### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inútilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

### “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. días	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/Ha	Kg/200L		
Papa	"Acaro hialino"	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	-	0.20	14	0.05
Ají amarillo	"Acaro hialino"	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	-	0.20	14	0.5
Limón	"Acaro del tostado"	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	-	0.16 - 0.24	14	0.5
	"Acaro hialino"	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	-	0.20		
	"Arañita roja de los citrus"	<i>Panonychus citri</i>	-	0.20 - 0.30		
Pepino dulce	"Acaro hialino"	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	-	0.20	14	0.1
Espárrago	"Arañita roja"	<i>Tetranychus sp.</i>	0.15 - 0.30	-	14	0.05
	"Acaro del tostado"	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	-	0.16 - 0.24		
Mandarina	"Acaro hialino"	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	-	0.20	14	0.5
	"Arañita roja de los citrus"	<i>Panonychus citri</i>	-	0.20 - 0.30		
	"Acaro del tostado"	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	-	0.16 - 0.24		
Naranja	"Acaro hialino"	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	-	0.20	14	0.5
	"Arañita roja de los citrus"	<i>Panonychus citri</i>	-	0.20 - 0.30		
Manzano	"Arañita roja"	<i>Tetranychus urticae</i>	-	0.30 - 0.40	14	0.5
Fresa	"Arañita roja"	<i>Tetranychus urticae</i>	-	0.20 - 0.25	7	0.05
Tomate	"Mosca blanca"	<i>Bemisia tabaci</i>	-	0.25	7	0.3
Frijol	"Mosca blanca"	<i>Bemisia tabaci</i>	-	0.25	7	0.05
Arroz	"Acaro"	<i>Steneotarsonemus spinki</i>	-	0.20 - 0.25	45	0.05
	"Arañita roja"	<i>Tetranychus urticae</i>	-	0.20	28	0.5
Vid	"Acaro"	<i>Colomerus vitis</i>	-	0.16 - 0.20		
Palto	"Acaro"	<i>Oligonychus punicae</i>	-	0.15 - 0.20	40	0.5

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)

P.C.: Período de Carencia (días)

